



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΠΤΙΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Μουσαβερé¹, Φώτιος Φουσέκης², Χαρίκλεια Λαμούρη³, Μιλτιάδης Μουτζούκης⁴, Νικόλαος Ψύχος⁵, Βασίλειος Θεόπιστος⁶, Νικόλαος Τζαμπούρας⁷, Κωνσταντίνος Κατσάνος⁸, Δημήτριος Χριστοδούλου⁹
Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΣΚΟΠΟΣ

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (ΠΣΧ) είναι μια χρόνια και προοδευτική νόσος των χοληφόρων οδών και συσχετίζεται συχνά με τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) και ιδιαίτερα με την ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να καταγράψει τον επιπολασμό της ΠΣΧ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ στη βορειοδυτική Ελλάδα.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν αναδρομικά από τα κλινικά αρχεία ασθενών της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, από το 2010 έως σήμερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΠΣΧ δεν ήταν συχνή στους ασθενείς με ΙΦΝΕ της ΒΔ Ελλάδας που μελετήθηκαν. Συνολικά βρέθηκαν 11 ασθενείς με ΠΣΧ επί συνόλου αρχείου 700 ασθενών. Από αυτούς 7 ασθενείς είχαν νόσο Crohn, 3 ασθενείς είχαν ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) και 1 ασθενής είχε ακαθόριστη κολίτιδα. Οι 10 ασθενείς διαγνώστηκαν με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα που αφορούσε τους μικρούς και τους μεγάλους πόρους (ένας είχε νόσο ενδοηπατικών χοληφόρων μόνο). Τέσσερις ασθενείς ήταν γυναίκες και οχτώ άνδρες. Σε 3 ασθενείς η ΠΣΧ διαγνώστηκε μετά τη διάγνωση της ΙΦΝΕ. Στις άλλες περιπτώσεις, ΙΦΝΕ και ΠΣΧ διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Επίσης, η φυσική ιστορία της ΠΣΧ ήταν ευνοϊκή και δεν υπήρξε ανάπτυξη χολαγγειοκαρκινώματος. Σε μία περίπτωση γυναίκας ασθενούς η νόσος ήταν εξελικτική με ανάπτυξη βαθέως ίκτερου και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος με καλή έκβαση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η συχνότητα της ΠΣΧ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ της περιοχής μας ήταν χαμηλή και παραδόξως υψηλότερη στη νόσο Crohn σε σχέση με την ελκώδη κολίτιδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξέλιξη της νόσου ήταν αργή για το διάστημα της παρακολούθησης και η έκβαση ευνοϊκή.

ΠΙΝΑΚΑΣ : Παρουσίαση ασθενών με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα. Οι εξετάσεις της ηπατικής τους λειτουργίας κατά την τελευταία τους επίσκεψη στο νοσοκομείο και η έκβαση της νόσου.

Φύλο	Ηλικία	IBD	AST(U/L)	ALT(U/L)	ALP(U/L)	GGT(U/L)	TBIL(mg/dl)	Διάρκεια PSC	Διάρκεια IBD	Θεραπεία για IBD	Έκταση PSC	Έκβαση
1.A	39	CD	34	30	61	25	1	22	22	ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ	ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
2.A	55	UC	33	62	103	132	0.8	16	16	ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
3.A	53	UC	19	15	79	37	0,8	3	3,5	ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
4.A	24	CD	14	19	50	33	0,7	8	8	ADALIMUMAB	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
5.Θ	65	CD	21	11	63	13	0,8	26	26	INFLIXIMAB 5mg/kg ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
6.A	35	CD	18	15	61	21	0,9	12	12	ADALIMUMAB	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
7.A	75	UC	97	58	92	41	0,7	19	20	ΜΕΣΑΛΑΖΙΝΗ	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΚΙΡΡΩΣΗ
8.A	29	IC	11	32	56	31	0,8	8	8	INFLIXIMAB 5mg/kg	ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
9.Θ	55	CD	19	22	94	95	1,2	2	10	ADALIMUMAB	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
10.A	39	CD	16	13	90	22	0,6	4	21	INFLIXIMAB 5mg/kg	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΑΡΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
11.Θ	58	CD	133	190	716	171	3,7	16	16	ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ	ΕΝΔΟ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ	ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ