

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΒV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ Η  
ΑΡΝΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ HbsAg - Α' ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Δ.Α. "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

Καπάτας Χ.<sup>1</sup>, Καραουλάνη Θ.<sup>3</sup>, Ματσούκα Ε.<sup>3</sup>, Κουντούρη  
Α.<sup>2</sup>, Τσαγκιά Σ.<sup>4</sup>, Αρμύρος Π.<sup>1</sup>, Λαμπρόπουλος Π.<sup>1</sup>,  
Τσάκαλης Ν.<sup>1</sup>, Υφαντή Α.<sup>1</sup>, Λαλέα Μ.<sup>1</sup>, Παυλοπούλου Θ.<sup>1</sup>,  
Σολωμού Σ.<sup>1</sup>, Καπάτας Α.<sup>1</sup>

**Εισαγωγή:** Η φυσική ιστορία της ΗΒV λοίμωξης περιλαμβάνει την αρνητικοποίηση του HbsAg (μικρό ποσοστό 1-2%/έτος) των ασθενών με χρόνια ΗΒV λοίμωξη, με χαμηλό τίτλο HbsAg, χαμηλό ιικό φορτίο και φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα.

**Σκοπός:** Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η αναδρομική παρατήρηση της αρνητικοποίησης του HbsAg στην ομάδα των ηπατοπαθών ασθενών με ΗΒV λοίμωξη.

**Υλικό - Μέθοδος:** Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ηπατοπαθείς ασθενείς με ΗΒV λοίμωξη που παρακολουθούνται στο Α' Ηπατολογικό τμήμα του Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα" την τελευταία 10ετία. Έγινε η καταγραφή της συχνότητας αρνητικοποίησης του HbsAg στον χρόνο παρακολούθησής τους καθώς επίσης και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ηπατοπαθών ασθενών (ηλικία, φύλο, συννοσηρότητες) και τα χαρακτηριστικά της ΗΒV λοίμωξης (HbeAg, ιικό φορτίο).

20<sup>ο</sup> Πανελλήνιο  
Ηπατολογικό Συνέδριο

29<sup>η</sup> Διημερίδα  
«Στέφανος Χατζηγιάννης»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ  
HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER

www.eemh2022.gr

26-29 Μαΐου 2022

Ξενοδοχείο Macedonia Palace Θεσσαλονίκη



**Αποτελέσματα:** Στην μελέτη μας συμπεριλήφθησαν 896 ασθενείς από τους οποίους οι 38 ασθενείς (22 άνδρες) παρουσίασαν αρνητικοποίηση HbsAg κατά την παρακολουθησή τους. Από αυτούς οι 12 (1,3%) είχαν HbeAg (+) στην διάγνωση και όλοι είχαν μέτρηση ιικού φορτίου που ήταν θετικό - χαμηλό ή μη ανιχνεύσιμο. Θεραπεία έλαβαν οι 12 ασθενείς (7 ETV, 4 TDF, 1 LAM). Σε 28 ασθενείς παρατηρήθηκε ορομετατροπή του HbsAg σε αντι-Hbs (+). Ο μέσος χρόνος αρνητικοποίησης του HbsAg ήταν 108 μήνες, 104 για όσους έλαβαν θεραπεία και 120 για όσους δεν έλαβαν θεραπεία. Ο μέσος χρόνος αρνητικοποίησης του HbsAg από την έναρξη της θεραπείας ήταν 68 μήνες.

**Συμπεράσματα:** Οι ασθενείς με χρόνια ΗΒV λοίμωξη παρατηρείται αρνητικοποίηση του HbsAg σε μικρό ποσοστό ασθενών με ή χωρίς θεραπεία, με κύρια ευρήματα HbeAg=(-) και χαμηλό ιικό φορτίο περίπου δέκα ετών.

<sup>1</sup> Α' Παθολογική κλινική- Α' Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα",

<sup>2</sup> Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού, Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα"

<sup>3</sup> Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού, Γενικό Νοσοκομείο-ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

<sup>4</sup> Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα"