



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ C ΜΕ ΜΕ DDAs. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τσαρούχης Κ , Ευταξίας Χ, Γιοβάνης Ε , Βαδαρλής Α , Τόλης Χ, , Μουαλλήμογλου Φ, Τίκος Γ , Βασιλείου Κ, Παυλής Α , Κοντονικόλα Α, Μπρούβαλης Μ, Καπετάνος Δ, Αυγερινός Α, Δημουλιός Φ, Μάρης Θ

Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΘ Γ Παπανικολάου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναδρομική μελέτη καταγραφής αποτελεσματικότητας των DAA's αντικών φαρμάκων στην θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (ΧΗC)

ΑΣΘΕΝΕΙΣ/ΜΕΘΟΔΟΣ

- Μελετήθηκαν 149 ασθενείς με ΧΗC (Α/Γ: 80/69) μέσης ηλικίας 51±12 έτη
- έλαβαν θεραπεία με τα νεότερα αντιικά φάρμακα μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Δεκεμβρίου του 2022.
- Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ελαστογραφία ήπατος και κανείς σε βιοψία.
- Σε όλους τους ασθενείς έγινε έναρξη θεραπείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ.
- Τα σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι grazoprevir /elbasvir, sofosbuvir/velpatasvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, ledipasvir/sofosbuvir, glecaprevir /pibrentasvir.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Όλοι οι ασθενείς πέτυχαν ιική κάθαρση 12 εβδομάδες μετά τη λήξη της θεραπείας, SVR 12:
- Στο χρονικό διάστημα παρακολούθησης παρατηρήθηκαν 4 επαναλοιμώξεις σε ασθενείς που είχαν λάβει sofosbuvir/velpatasvir) και τέθηκαν σε επαναθεραπεία με voxilaprevil, sofosbuvir, velpatasvir με ιολογική ανταπόκριση την 12 εβδομάδα.
- Σε κανέναν ασθενή δεν σημειώθηκε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας
- Η ελαστογραφία μετά την θεραπεία δεν έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά (8,2kPa προ, μετά 7,9), Metavir F3/F3. Οι ασθενείς παρέμειναν πρακτικά στο ίδιο στάδιο ίνωσης.
- Η παρακολούθηση συνεχίζεται. Κανείς ασθενής δεν χάθηκε στο follow-up έστω και με τηλεφωνική επικοινωνία και άυλη συνταγογράφηση/παραπεμπτικά εξετάσεων λόγω COVID 19.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η θεραπεία με τα νεότερα αντιικά DDA's είναι ασφαλής και αποτελεσματική.
- Μικρός αριθμό ασθενών χρειάζεται επαναθεραπεία με voxilaprevil, sofosbuvir, velpatasvir .