

eP53-ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Καπάτας Χρ.2, Καραουλάνη Θ.1, Πίτσια Τρ.1, Λάσκος Ε.1, Κουντούρη Α.3, Θεοδώρου Μ.3, Τσαγκιά Σ.4, Μπαλαχούτη Μ.1, Τζουράς Ν.1, Αντωνίου Κ.1, Κούβαρη Θ.1, Αντωνιάδου Β.1, Μεσολογγίτης Κ.1, Γεωργιάδου Μ.1, Τσιανίκα Άρ.2, Λαμπρόπουλος Π.2, Αρμύρος Π.2, Ξυντάρης Μ.2, Τσάκαλης Ν.2, Υφαντή Αρετή2, Λαλέα Μ.2, Σολωμού Σ.2, Καπάτας Α.2

ABSTRACT

Εισαγωγή: Η καταπολέμηση όλων των μορφών της ηπατίτιδας και η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στις υπάρχουσες θεραπείες αποτελεί στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιλαμβάνεται στην 63η διακήρυξη του Οργανισμού.

Σκοπός: Η μελέτη μας είχε σκοπό την εκτίμηση του επιπολασμού των ορολογικών δεικτών ιογενών ηπατίτιδων Β, C, D στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Παθολογική-Ηπατολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ορολογικός έλεγχος όλων των νοσηλευόμενων στην Παθολογική-Ηπατολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας από 01/01/2019 έως 31/12/2022

Αποτελέσματα: Συνολικά 1780 ασθενείς, 385(21,63%) μετανάστες και 1395(78,37%) Έλληνες. Από αυτούς τους ασθενείς οι 223(12,53%) είχαν εκτεθεί στους ιούς Β, C και D. Στους εκτεθειμένους στους ιούς Β και C, οι 72% ήταν ελληνικής καταγωγής και οι 28% μετανάστες. Η μέση ηλικία ήταν 58,2± 21,2 έτη με μεγαλύτερη ηλικία στους Έλληνες (62±14). 64% ήταν άνδρες και 36% γυναίκες. Στην HBV λοίμωξη είχαν εκτεθεί 87(39,01%) ενώ το 1,8% είχε θετικό HbsAg, εκ των οποίων 2,1% είχε HbeAg θετικό. Στους 22,5% των νοσηλευόμενων μεταναστών ήταν με θετικό HbsAg σε αντίθεση με το 3% των Ελλήνων νοσηλευόμενων. Επίσης από το σύνολο των νοσηλευόμενων οι 45(20,18%) είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό C, όπου και έγινε έλεγχος με PCR HCV-RNA. Το anti- HCV των θετικών CHC ασθενών στους ελληνικής καταγωγής νοσηλευόμενους ήταν 31% ενώ στους μετανάστες 5,8%. Στους 9(4,04%) ασθενείς είχαν επιβεβαιωμένη επαφή με HBC-HCV και 3 ασθενείς(1,34%) με ηπατίτιδα D.

Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας, ο επιπολασμός στους νοσηλευόμενους ασθενείς των ορολογικών δεικτών για την ιογενή ηπατίτιδα Β ήταν 26% και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο ο επιτυχής εμβολιασμός για την Β ενώ ο επιπολασμός της C ανέρχεται σε 2,9% των νοσηλευόμενων ασθενών χωρίς ενεργό νόσηση. Η αθρόα, όμως, εισροή μεταναστών είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγή της επιδημιολογίας των χρόνιων ηπατίτιδων στον Ελλαδικό χώρο

CONTACT

ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού, Γ.Ν.-Ψ.Ν.Α.
"Δρομοκαΐτειο",
Email: faniekaraoulani@yahoo.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καταπολέμηση όλων των μορφών της ηπατίτιδας και η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στις υπάρχουσες θεραπείες αποτελεί στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιλαμβάνεται στην 63η διακήρυξη του Οργανισμού.

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Σκοπός: Η μελέτη μας είχε σκοπό την εκτίμηση του επιπολασμού των ορολογικών δεικτών ιογενών ηπατίτιδων Β, C, D στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Παθολογική-Ηπατολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ορολογικός έλεγχος όλων των νοσηλευόμενων στην Παθολογική-Ηπατολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας από 01/01/2019 έως 31/12/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά 1780 ασθενείς, 385(21,63%) μετανάστες και 1395(78,37%) Έλληνες. Από αυτούς τους ασθενείς οι 223(12,53%) είχαν εκτεθεί στους ιούς Β, C και D. Στους εκτεθειμένους στους ιούς Β και C, οι 72% ήταν ελληνικής καταγωγής και οι 28% μετανάστες.

Η μέση ηλικία ήταν 58,2± 21,2 έτη με μεγαλύτερη ηλικία στους Έλληνες (62±14). 64% ήταν άνδρες και 36% γυναίκες.

Στην HBV λοίμωξη είχαν εκτεθεί 87(39,01%) ενώ το 1,8% είχε θετικό HbsAg, εκ των οποίων 2,1% είχε HbeAg θετικό.

Στους 22,5% των νοσηλευόμενων μεταναστών ήταν με θετικό HbsAg σε αντίθεση με το 3% των Ελλήνων νοσηλευόμενων.

Επίσης από το σύνολο των νοσηλευόμενων οι 45(20,18%) είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό C, όπου και έγινε έλεγχος με PCR HCV-RNA. Το anti- HCV των θετικών CHC ασθενών στους ελληνικής καταγωγής νοσηλευόμενους ήταν 31% ενώ στους μετανάστες 5,8%.

Στους 9(4,04%) ασθενείς είχαν επιβεβαιωμένη επαφή με HBC-HCV και 3 ασθενείς(1,34%) με ηπατίτιδα D.

Από το σύνολο των νοσηλευόμενων οι 45(20,18%) είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό C, όπου και έγινε έλεγχος με PCR HCV-RNA. Το anti- HCV των θετικών CHC ασθενών στους ελληνικής καταγωγής νοσηλευόμενους ήταν 31% ενώ στους μετανάστες 5,8%. Στους 9(4,04%) ασθενείς είχαν επιβεβαιωμένη επαφή με HBC-HCV και 3 ασθενείς(1,34%) με ηπατίτιδα D.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στη χώρα μας, ο επιπολασμός για τη χρόνια ηπατίτιδα Β υπολογίζεται σε 2.5-3% του πληθυσμού και για την ηπατίτιδα C σε 1.5-2% του πληθυσμού, ενώ η επίπτωση των χρόνιων ιογενών ηπατίτιδων ποικίλλει ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και πληθυσμό.

Οι κύριες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία είναι η αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών από την ηπατική νόσο και η διασπορά των ιών αυτών στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι σημαντικό ποσοστό των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C καταλήγουν από επιπλοκές της χρόνιας λοίμωξης όπως κίρρωση του ήπατος, ηπατοκυτταρικό καρκίνο (HCC), ηπατική ανεπάρκεια και θάνατο εφόσον δεν τεθούν σε παρακολούθηση και δεν λάβουν ειδική αντιική αγωγή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη μας, ο επιπολασμός στους νοσηλευόμενους ασθενείς των ορολογικών δεικτών για την ιογενή ηπατίτιδα Β ήταν 26% και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο ο επιτυχής εμβολιασμός για την Β ενώ ο επιπολασμός της C ανέρχεται σε 2,9% των νοσηλευόμενων ασθενών χωρίς ενεργό νόσηση. Η αθρόα, όμως, εισροή μεταναστών είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγή της επιδημιολογίας των χρόνιων ηπατίτιδων στον Ελλαδικό χώρο

AFFILIATIONS

- Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού, Γ.Ν.-Ψ.Ν.Α. "Δρομοκαΐτειο",
- Α' Παθολογική Κλινική, Α' Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα",
- Εργαστήριο Βιοχημικού, Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α."Αγία Βαρβάρα",
- 4Κέντρο Μεσογειακής Αναμίας, Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α."Αγία Βαρβάρα"

