


ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ: ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Μαστρογιάννης Κ.¹, Λιάκος Α.¹, Ασπράγκαθου Σ.¹, Παπαχρήστου Σ.¹, Τσουμελέκα Μ.¹, Μπουρτζής Β.¹, Κερεμισή Μ.¹, Γιγή Λαγοπούλου Ε.¹

¹Β' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Εισαγωγή:
Οι στατίνες αποτελούν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία φαρμάκων για τον έλεγχο της δυσλιπιδαιμίας με την ατορβαστατίνη να αποτελεί έναν απ' τους κυριότερους εκπροσώπους της. Αποτελούν ασφαλή φάρμακα με μικρό ποσοστό εμφάνισης φαρμακοεπαγόμενης ηπατικής βλάβης.(πίνακας 1) Παρουσιάζουμε μια περίπτωση φαρμακοεπαγόμενης ηπατικής βλάβης σε γυναίκα 68 ετών με ιστορικό ΣΔ, ΑΥ, δυσλιπιδαιμίας και υποθυρεοειδισμού.

Πίνακας 1: Στατίνες και ηπατική βλάβη	
Ηπια αύξηση τρανσαμινασών	3-5,5%
Μυοπάθεια	<0.15%
Αύξηση τρανσαμινασών >3 ULN	<0.15%



Κλινική Περίπτωση:
Η ασθενής εμφάνισε αδυναμία, καταβολή, κακουχία και απώλεια βάρους 5 kg, 6 εβδομάδες μετά την έναρξη ατορβαστατίνης, χωρίς διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας. 12 εβδομάδες μετά την έναρξη αγωγής ανώδυνο ίκτερο με αυξημένα αποφρακτικά και ηπατικά ένζυμα (ALT 549IU/ml, AST 440 IU/ml, ALP 360mg/dl, GGT 724 mg/dl) . Η εκτεταμένη εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση δεν ανέδειξε άλλη αιτία ηπατικής βλάβης. Μετά τη διακοπή της ατορβαστατίνης, παρατηρήθηκε σταδιακή κλινική και εργαστηριακή βελτίωση, με πλήρη εξαφάνιση των συμπτωμάτων και φυσιολογικό βιοχημικό έλεγχο δύο μήνες μετά.(γράφηματα 1 και 2)

Συμπεράσματα:
Η περίπτωση υπογραμμίζει τη σημασία της ιατρικής ενημέρωσης για πιθανές σπάνιες παρενέργειες στατινών, όπως η φαρμακοεπαγόμενη ηπατική βλάβη. Η ατορβαστατίνη μπορεί σπάνια να προκαλέσει οξεία ηπατική βλάβη. Η γρήγορη διάγνωση και διακοπή της αγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη μακροπρόθεσμης ηπατικής βλάβης.

