



ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C-ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ψαρομπάς Ι.,Κολαινής Β.,Καΐκης Α., Μανώλακα Χ., Κούρτης Δ., Ρούφας Ν., Παπαβασιλείου Κ., Χατζηδακη Δ.,Αναστασίου Ι., Διακονικόλα Δ., Φωτεινού Α., Χατζήπαπας Α., Μονοκάνδυλος Ν., Κούκ Α., Αργυρού Α., Καραταπάνης Σ.

Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ρόδου, Ρόδος

ABSTRACT

Click here to insert your Abstract text. Type it in or copy and paste from your Word document or other source.

This text box will automatically re-size to your text.

To change the background color of this text box: Double-click near the edge to open the Format tool, select 'Colors and Lines', and change the fill color to whatever you like.

To change the font style of this text box: Click on the border once to highlight the entire text box, then select a different font or font size that suits you.

This text is in Arial 28pt (equivalent to 34pt when printed) and is easily readable up to 6 feet away on a 36" x 60" poster (file printed at 120%).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστό ότι η χρόνια ηπατίτιδα C συνδυάζεται με ποικιλία εξωηπατικών εκδηλώσεων.

Μολονότι δεν υπάρχουν παθογνωμονικές εκδηλώσεις της χρόνιας ηπατίτιδας C από τον οφθαλμό, έχουν όμως περιγραφεί αρκετά οφθαλμικά σύνδρομα και της HCV λοίμωξης.

Μέχρι σήμερα οι κυριότερες οφθαλμικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν σύνδρομο ξηροφθαλμίας παρόμοιο με το σύνδρομο Sjogren, και ισχαιμική αμφιβληστροειδοπάθεια που συνδέεται με HCV επαγόμενη αγγειίτιδα (παλαιότερα ενοχοποιείτο και η θεραπεία με ιντερφερόνη).

ΣΚΟΠΟΣ

Σας παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας ασθενούς με χρόνια ηπατίτιδα Cπου παρουσίασε εκδηλώσεις χοριοειδίτιδας λογω συνυπάρχουσας αγγειίτιδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πρόκειται για γυναίκα 48 ετών που από διμήνου εμφάνισε εκδηλώσεις από τον οφθαλμό (άμβλυνση στην όραση, σκοτώματα).

Η ασθενής επισκέφθηκε οφθαλμίατρο και στη βυθοσκόπηση διαπιστώθηκε χοριοειδίτιδα που αποδόθηκε σε πιθανή αγγειίτιδα.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε περαιτέρω έλεγχο και διαπιστώθηκε η ύπαρξη HCV λοίμωξης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η οφθαλμική βλάβη αποδόθηκε σε σύνοδο αγγειίτιδα στον οφθαλμό και παραπέμφθηκε για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Διαπιστώθηκε θετικό HCV-RNA στον ορό και η ασθενής υποβλήθηκε σε αγωγή με από του στόματος αντιικό παράγοντα (sofosbuvir/velbatasvir). Επανεξέταση από τον οφθαλμίατρο στο τέλος της αγωγής έδειξε σημαντική βελτίωση των ευρημάτων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μολονότι οι εξωηπατικές εκδηλώσεις της HCV λοίμωξης είναι αναγνωρισμένες σε διάφορα όργανα και συστήματα, οι οφθαλμικές εκδηλώσεις (ξηροφθαλμία ή ισχαιμική αμφιβληστροειδοπάθεια) είναι σπάνιες αλλά πρέπει να τις αναγνωρίζουμε σε σχετικές εκδηλώσεις από τον οφθαλμό.

REFERENCES

- [Treatment and non-treatment related ocular manifestations in patients with chronic hepatitis B or C.](#)Tsoumani A, Theopistos V, Katsanos K, Asproudis I, Tsianos EV.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Apr;17(8):1123-31
- [Extrahepatic Manifestations of Chronic Hepatitis C Virus \(HCV\) Infection.](#)Garg B, Arbabi A, Kirkland PA.Cureus. 2024 Mar 31;16(3):e57343.

Figure 1. Label in 24pt Arial.

	A	B	C	D
Patient 1				
Patient 2				
Patient 3				
Patient 4				

Table 1. Label in 24pt Arial.

Figure 2. Label in 24pt Arial.




Chart 1. Label in 24pt Arial.

Figure 3. Label in 24pt Arial.




Chart 2. Label in 24pt Arial.