

# Σπάνια περίπτωση ψευδοανευρύσματος κερκιδικής αρτηρίας μετά από απλή λήψη αερίων αίματος σε καρδιολογικό ασθενή – Παρουσίαση περιστατικού

Σωτήρης Πλακούτσας, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Γιώτης, Χρήστος Κώτσιας, Δημήτριος Βαρδάκας, Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Ορθοπαιδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

## Εισαγωγή

Ψευδοανεύρυσμα κερκιδικής αρτηρίας

- πολύ σπάνια επιπλοκή (<0,1%)
- μετά από καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας
- προέρχεται από εξαγγείωση & διαφυγή αίματος προκαλώντας μια σφύζουσα περιοχική διόγκωση

Προδιαθεσικοί παράγοντες

- πολλαπλές προσπάθειες καθετηριασμού
- συστηματική λήψη αντιπηκτικών
- ανεπαρκής αιμόσταση
- λοίμωξη στο σημείο της παρακέντησης

## Σκοπός

Η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης ψευδοανευρύσματος κερκιδικής αρτηρίας σε ηλικιωμένο άνδρα με καρδιακή ανεπάρκεια μετά από λήψη αερίων αίματος

## Υλικό & Μέθοδος

- ♂ 79 ετών, νοσηλευόμενος στην Κ/Δ λόγω καρδιακής ανεπάρκειας (ιστορικό ΚΜ & ΣΝ) υπό αντιπηκτική αγωγή
- 4 ημέρες μετά τη λήψη αερίων αίματος → μόρφωμα εκτός του δέρματος ύπερθεν της ΑΡ κερκιδικής αρτηρίας
- Κλινική εξέταση → Παρουσία σφύξεων κεντρικά και περιφερικά του μορφώματος
- Triplex αγγείων & MRI → ύπαρξη ψευδοανευρύσματος στην κερκιδική αρτηρία με παρουσία λεπτού μίσχου

## Συμπεράσματα

Το ψευδοανεύρυσμα της κερκιδικής αρτηρίας είναι μια σπάνια οντότητα → δεν πρέπει να υποεκτιμάται → εν δυνάμει απειλητική λόγω της πιθανότητας ρήξης → να τίθεται πάντα στη διαφορική μας διάγνωση μετά από καθετηριασμούς

## Αποτελέσματα

- Χ/Ο → Αφαίρεση του ψευδοανευρύσματος με απολίνωση του μίσχου υπό γενική αναισθησία
- 4 ημέρες ΜΤΧ → Έξοδος από Νοσοκομείο με οδηγίες αποχής από έντονη χειρωνακτική δραστηριότητα
- 3 μήνες ΜΤΧ → Χωρίς υποτροπή



Εικ. 1: Ψευδοανεύρυσμα κερκιδικής αρτηρίας



Εικ. 2: Διεγχειρητική απεικόνιση ψευδοανευρύσματος

Εικ. 3: Παρουσία λεπτού μίσχου