

# Follow-up ασθενούς με μεικτή τραυματική βλάβη του άκρου ποδός και επέμβαση διάσωσης (salvage) με διαμετατάρσιο ακρωτηριασμό

Αργύρης Χατζημιχαήλ, Αθανάσιος Αντωνόπουλος, Αθανάσιος Φούκας

Γ' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΑΤ"

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ:** Η χειρουργική τεχνική αποκατάστασης τραυματικής μεικτής βλάβης του άκρου ποδός αποτελεί πρόκληση για τον ορθοπαιδικό, καθώς καλείται να επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο ακρωτηριασμού για την διάσωση του μέλους. Ο διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός αποτελεί μία εκ των χειρουργικών τεχνικών. Σκοπός να αξιολογηθεί η μετεγχειρητική πορεία ασθενούς που υποβλήθηκε σε διαμετατάρσιο ακρωτηριασμό του άκρου ποδός εξαιτίας βαρείας συνθλιπτικής κάκωσης.

**ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΣ:** Γυναίκα 37 ετών με βαρεία συνθλιπτική κάκωση και απογαντισμό στον άκρο πόδα από ρόδες λεωφορείου. Πραγματοποιήθηκαν: [1] ψηφιακή αγγειογραφία με αξονική τομογραφία, ώστε να καθοριστεί με ασφάλεια το επίπεδο του ακρωτηριασμού, [2] διατηρήθηκαν οι καταφύσεις του βραχύ περονιαίου, του οπίσθιου κνημιαίου, του πρόσθιου κνημιαίου, [3] μεταφέρθηκε ο μακρός περονιαίος κεντρικότερα στην πελματιαία επιφάνεια του 1ου μεταταρσίου και του έσω σφηνοειδούς, [4] οι καμπτήρες και εκτείνοντες των δακτύλων συρράπηκαν μεταξύ τους περιφερικά των οστικών κολοβωμάτων και [5] διαδερμική επιμήκυνση του Αχιλλείου τένοντα, [6] δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους από τον μηρό στην πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδός λόγω δερματικού ελλείμματος.

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα σε ελεύθερη βάδιση και σε έντονο τρέξιμο (υψηλές φορτίσεις).

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:** Διαμετατάρσιος ακρωτηριασμός με βέλτιστα λειτουργικά αποτελέσματα όταν πληροί τις ενδείξεις επαρκούς αιμάτωσης και όταν η χειρουργική τεχνική λαμβάνει υπόψη τις εμβιομηχανικές μεταβολές.

## ΗΜΕΡΑ 0



## 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ



## 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ



77<sup>ο</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ &  
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

