

# ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑΦΥΣΗΣ ΩΛΕΝΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ασθενής 21 ετών με ανοικτό τραύμα εντοπιζόμενο παλαμιαίως στην ωλενια μοίρα καρπού από αλυσοπρίονο.



Κατά την κλινική εξέταση παρουσίαζε αδυναμία ωλένιας προσαγωγής του καρπού και υπαισθησία στις άπω φάλαγγες του 4<sup>ου</sup> και 5<sup>ου</sup> δακτύλου σύστοιχα.

## ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Η χειρουργική διερεύνηση του τραύματος ανέδειξε διατομή του ωλενιού καμπτήρα στο ύψος της κατάφυσης του στο πισοειδές οστό και μερική διατομή ωλένιο νεύρο.



Εικόνα: Ωλένιο Νεύρο με μερική διατομή

Σε επανέλεγχο ένα μήνα μετά την επέμβαση ο ασθενής είχε ανακτήσει τη λειτουργικότητα του ωλένιου καμπτήρα. Προοδευτικά αποκαταστάθηκε η λειτουργικότητα του ωλενίου νεύρου καθώς η αισθητικότητα των άπω φαλάγγων του 4<sup>ου</sup> και 5<sup>ου</sup> δακτύλου είχε επανέλθει σε σημαντικό βαθμό εντός τριμήνου από τον πρώτο επανέλεγχο ενώ δεν παρουσίασε ατροφία υποθέναρος ούτε μεσόστεων μυών.

Στο ωλένιο νεύρο έγινε συρραφή ενώ ο ωλένιος καμπτήρας καθότι είχε αποκολληθεί από την κατάφυση του επανακαθηλώθηκε στο πισοειδές οστό με χρήση οστικής άγκυρας.



Εικόνα: Καθήλωση ωλένιου καμπτήρα με οστική άγκυρα

## ΕΚΒΑΣΗ

