

Κατάγματα του οπισθίου τμήματος του κνημιαίου plateau

Σκουτέρης Δημήτριος, Δεδούση Γεωργία, Χριστόπουλος Παναγιώτης, Βασίλειος Ν. Ψυχογιός
Ε' ορθοπαιδικό τμήμα, μονάδα χεριού και μικροχειρουργικής, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα αναδρομική μελέτη έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της εμπειρίας μας στην χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του οπισθίου τμήματος του κνημιαίου πλατώ των περιπτώσεων.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Στη μελέτη περιελήφθησαν 11 ασθενείς με κάταγμα του οπισθίου τμήματος του κνημιαίου πλατώ που αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία 7 έτη (2015-2022). Επρόκειτο για 8 άνδρες και 3 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 52 έτη (25-68 έτη). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης είτε με οπίσθια έσω προσπέλαση ή με συνδυασμό οπίσθιας έσω και έξω προσπέλασης του γόνατος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όλοι οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά παρουσίασαν πώρωση του κατάγματος της κνήμης εντός 13 εβδομάδων κατά μέσο όρο (10-18 εβδομάδες). Ένας ασθενής παρουσίασε λοίμωξη η οποία αντιμετωπίστηκε με χειρουργικό καθαρισμό χωρίς αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης, ενώ μία ασθενής στην οποία έγινε χρήση διπλής προσπέλασης παρουσίασε παροδική πάρεση του κοινού περονιαίου νεύρου. Ο μέσος όρος κάμψης έκτασης του γόνατος ήταν 0-117 με μέση απώλεια 15 σε σχέση με το μη χειρουργηθέν γόνατο.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα κατάγματα του οπισθίου κνημιαίου πλατώ μπορούν να αντιμετωπισθούν ικανοποιητικά με τη μόνη χρήση της οπίσθιας έσω προσπέλασης ή σε συνδυασμό με την έξω πλάγια προσπέλαση και πλακών στήριξης (buttress plates).