

Χρήστος Κουτσερίμπας^{1,2}, Γεώργιος Τσακωτός², Γεώργιος Τριανταφύλλου², Βασίλειος Καραμπελιάς², Μαρία Πιάγκου²

1. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
2. Εργαστήριο Ανατομίας, «Ανατομείο», Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κερκιδική και ωλένια αρτηρία αποτελούν την κύρια αιμάτωση του αντιβραχίου. Η ευμεγέθης εμμένουσα μέση αρτηρία αποτελεί ένα μια ανατομική παραλλαγή, καθώς η μέση αρτηρία είναι ένα κανονικά ένα μικρό αρτηρίδιο με συμμετοχή στην αιμάτωση του μέσου νεύρου στο αντιβράχιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη δεξιά πλευρά ταυτοποιήθηκε εμμένουσα μέση αρτηρία, η οποία κατέληγε στον καρπό, οπισθίως της παλαμιαίας απονεύρωσης. Η αριστερή εμμένουσα μέση αρτηρία κατέληγε στην παλάμη συμβάλλοντας στην αγγείωση του 3^{ου} και 4^{ου} δακτύλου.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Παρουσιάζεται σπάνια περίπτωση αμφοτερόπλευρης ύπαρξης εμμένουσας μέσης αρτηρίας σε πτωματικό υλικό και συζητείται η κλινική σημασία της παραλλαγής. Η αμφοτερόπλευρη ύπαρξη της εμμένουσας μέσης αρτηρίας ανευρέθηκε σε πτώμα 80 χρόνου άνδρα δωρητού σώματος, ταριχευμένο σε διάλυμα φορμόλης. Το σώμα δωρίσθηκε στο Εργαστήριο Ανατομίας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εμμένουσα μέση αρτηρία αποτελεί παραλλαγή που πρέπει να είναι γνωστή στους χειρουργούς που πραγματοποιούν προσπελάσεις του αντιβραχίου και του χεριού. Μπορεί να αποτελεί αιτία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα. Κατά τη διερεύνηση μιας τέτοιας κατάστασης, το υπερηχογράφημα Doppler μπορεί να αναδείξει την αιματική ροή της περιοχής, ενώ η αγγειογραφία μπορεί να αναδείξει πιθανή θρόμβωση του αγγείου. Επιπρόσθετα, η εμμένουσα μέση αρτηρία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική οδό αιμάτωσης του χεριού σε βαριά τραύματα της κερκιδικής, και της ωλένιας αρτηρίας.

