

Εισαγωγή -Σκοπός της μελέτης

Η παρουσίαση περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας μετά διαφυγή ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας.

Υλικό και Μέθοδος

Κατά τη χρονική περίοδο 2020-2023 αντιμετωπίστηκαν 6 ασθενείς (4 γυναίκες και 2 άνδρες) ηλικίας 30 έως 72 ετών. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν διαφυγή σκιαγραφικής ουσίας που χορηγήθηκε μέσω ενδοφλέβιου καθετήρα στη ραχιαία επιφάνεια της άκρα χείρας, για διενέργεια αξονικής τομογραφίας. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν εντός των πρώτων έξι ωρών από την εμφάνιση του οιδήματος υπό γενική αναισθησία ή περιοχική. Πραγματοποιήθηκαν 2 ραχιαίες και μια παλαμιαία τομή σε τέσσερις περιπτώσεις και σε 2 ασθενείς 2 ραχιαίες και 2 παλαμιαίες.



Αποτελέσματα

Σε 2 περιπτώσεις παρουσιάστηκε μικρής έκτασης νέκρωση δέρματος στη ραχιαία επιφάνεια της άκρα χείρας που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με συχνές αλλαγές τραύματος. Σε όλους τους ασθενείς υπήρξε ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα

Συμπεράσματα

Η εμφάνιση συνδρόμου διαμερίσματος μετά διαφυγή ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας αποτελεί κατάσταση επείγουσα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.