

SARCOID LIKE ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ : ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ αντι - HER2 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΟΧΙ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α., ΜΟΛΥΒΑ Δ., ΜΠΛΕΚΑ Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜ., ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Χ.
ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Νέες στοχευμένες θεραπείες όπως και η ανοσοθεραπεία μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται και με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Γυναίκα 40 ετών τον 02/2015 διαγνώστηκε με τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού, τριπλά αρνητικό όγκο. Έλαβε εισαγωγική χημειοθεραπεία και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μαστεκτομή ypT1N1. Ακολούθως έλαβε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.

Τον 09/2017 λόγω δυο μεταστάσεων στο ήπαρ οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με PET- CT (SUV:6.9) και κατευθυνόμενη βιοψία. Η ιστολογική έδειξε: ER:-, Pr:-, cerbb2:+3, fish+.

Ξεκίνησε χημειοθεραπεία docetaxel- pertuzumab- trastuzumab και μετά από 6 κύκλους έλαβε συντήρηση. Οι αξονικές έδειχναν σταθερές τις βλάβες αλλά με εικόνα νέκρωσης. Το PET- CT έδειξε πλήρη απεικονιστική ανταπόκριση εκτός από παθολογική πρόσληψη σε λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο (suv :8.4).

Έγινε βιοψία EBUS και η ιστολογική εξέταση έδειξε ευρήματα σαρκοείδωσης (κοκκιωματώδης ιστός). Εξέταση ACE στο αίμα ήταν φυσιολογική.

Η γυναίκα 45 ετών ανέφερε συμπτώματα κόπωσης και σπασμών στο πρόσωπο τους τελευταίους μήνες τα οποία απέδωσε στη θεραπεία. Το στάδιο σαρκοείδωσης είναι I. Η ασθενής συνεχίζει trastuzumab.

