

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ PARP ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΩΝ

Κοντάνα Ευ., Ανδρεάδου Ά., Τήκας Ι., Ντέρτσος Ν., Φωταρέλλη Α., Ανδρεάδης Χ.
Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Γ΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση των αναστολέων parp ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με bevacizumab με βάση την κατάσταση HRD των όγκων φαίνεται ότι βελτιώνει την επιβίωση των γυναικών με καρκίνο ωοθηκών, ακόμα και αυτών που δεν φέρουν κάποια μετάλλαξη.

Είναι όμως λογικό να προκύπτουν νέα ερωτήματα, όπως ποιος είναι ο βέλτιστος χειρισμός στην υποτροπή: η χειρουργική επέμβαση ογκομείωσης ή η έναρξη χημειοθεραπείας και η συντήρηση με αναστολείς parp ακόμη και σε γυναίκες με brca wild type, γεγονός που επιβάλλει τη διενέργεια περαιτέρω κλινικών δοκιμών. Οι παρακάτω περιπτώσεις ασθενών αντανακλούν μια πιθανή θεραπευτική επιλογή με αναστολείς parp για τη διατήρηση πλήρους ύφεσης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της χρήσης των parp αναστολέων ως θεραπεία συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία σε υποτροπιάζοντα καρκίνο ωοθηκών με σκοπό τη διατήρηση πλήρους ύφεσης.

ΜΕΘΟΔΟΙ

- ❑ 4 ασθενείς γυναίκες
- ❑ Διάγνωση καρκίνου ωοθηκών σταδίου Ic-IIIc

Το σύνολο των γυναικών χειρουργήθηκαν και ακολούθως έλαβαν επικουρική χημειοθεραπεία.

Οι γυναίκες σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά μεγαλύτερο των 6 μηνών, υποτροπίασαν, αλλά κρίθηκε επισφαλής η επίτευξη πλήρους ογκομείωσης και συστήθηκε η έναρξη χημειοθεραπείας. Μετά το πέρας έξι κύκλων, διενεργήθηκε PET-CT όπου ανεδείχθη πλήρης υποχώρηση της νόσου και οι γυναίκες τέθηκαν σε θεραπεία συντήρησης με niraparib.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ❑ Γυναίκες ηλικίας 43-54 ετών
- ❑ Διάγνωση καρκίνου ωοθηκών σταδίου Ic-IIIc
- ❑ Χειρουργική εξαίρεση
- ❑ Συμπληρωματική χημειοθεραπεία (2018-2019)
- ❑ Υποτροπή νόσου 1-2 έτη μετά
- ❑ Χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
- ❑ Πλήρης ανταπόκριση (βάσει αξονικών, PET)
- ❑ Έναρξη θεραπείας με parp αναστολείς (niraparib, Olaparib)

	Age diagnosis	surgery	adjuvant	Recurrence	1 st line	Parpi
1	46	13/12/2019	Taxol carbo	07/2021	Cis-gem	niraparib
2	54	11/12/2018	Taxol-carbo	10/2021	Cis-gem	niraparib
3	43	20/11/2017	Taxol-carbo	08/2019	Cis-gem	niraparib
4	47	20/12/2018	Taxol-carbo	07/2020	Cis-gem	niraparib

Οι ασθενείς παραμένουν έως και σήμερα χωρίς υποτροπή νόσου. Η θεραπεία χορηγείται μέχρι στιγμής σε δυο γυναίκες για ένα έτος, σε μια για δυο και η άλλη λαμβάνει niraparib για τρία έτη. Οι γυναίκες είναι BRCA wt και παρουσιάζουν καλή ανοχή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ζώντας τη νέα εποχή της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία, είναι απαραίτητη η αναζήτηση νέων θεραπευτικών επιλογών για γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών. Πληροφορίες του όγκου όπως η μετάλλαξη BRCA ή το HRD score, μπορεί να βοηθήσουν, αλλά ακόμα και για γυναίκες με HRDp η χρήση των αναστολέων parp μπορεί να προσφέρει καλύτερη επιβίωση.