

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΓΚΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ Ο ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Καραχάλιος Χ., Μπουσού Θ, Λιούτα Γ, Μπριστογιάννη Μ, Παναγιωτούνη Μ, Σγούρα Χ, , Νάση Δ, Λάσχος Κ, Τριποδάκη ΕΣ, Ρες Ε, Βισβίκης Α, Σαμαντάς Ε, Σγουρός Ι.
Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σε ασθενείς με γαστροοισοφαγικό καρκίνο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, η συστηματική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής. Είναι άγνωστο αν η αφαίρεση της πρωτοπαθούς εστίας πριν την έναρξη θεραπείας, αυξάνει την επιβίωση αυτών των ασθενών. Στην προσπάθεια διευκρίνισης του οφέλους μίας τέτοιας επέμβασης, θελήσαμε να δούμε σε τι συχνότητα εμφανίζονται επιπλοκές από τον πρωτοπαθή όγκο σε ασθενείς που παρουσιάζονται με τοπικά προχωρημένη ή μεταστατική νόσο και ξεκινούν συστηματική θεραπεία χωρίς εκτομή της πρωτοπαθούς εστίας. Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών που διαγνώστηκαν εξαρχής με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό αδenoκαρκίνωμα στομάχου, γαστροοισοφαγικής συμβολής ή οισοφάγου που προσήλθαν στην Κλινική την περίοδο 2019-2024 για έναρξη θεραπείας χωρίς να έχει αφαιρεθεί ο πρωτοπαθής όγκος. Έγινε καταγραφή είδους και συχνότητας επιπλοκών από την πρωτοπαθή εστία, και προσπάθεια συσχετισμού αυτών με χαρακτηριστικά ασθενών και χαρακτηριστικά κακοήθους όγκου. Καταγράφηκε το χρονικό διάστημα της εμφάνισής τους από την αρχική διάγνωση και η διάμεση επιβίωση ασθενών με ή χωρίς επιπλοκές.

Σκοπός: Η παρουσίαση της καταγραφής των επιπλοκών από τον πρωτοπαθή όγκο και πώς αυτές επηρέασαν την επιβίωση των ασθενών. Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 24 ασθενείς (14 άντρες, 10 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 68.25 ετών (εύρος 26 – 82). Οι 23 είχαν μεταστατική νόσο. Οι συχνότερες εστίες δευτεροπαθών εντοπίσεων αφορούσαν ήπαρ και κοιλιακούς λεμφαδένες. Μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 18 μήνες, δεκαπέντε (62.5%) εμφάνισαν επιπλοκές από τον πρωτοπαθή όγκο (7 αιμορραγία, 6 απόφραξη, 2 αιμορραγία και απόφραξη) με διάμεσο χρόνο από την αρχική διάγνωση τους 8 μήνες (εύρος 1-66 μήνες). Η διάμεση τιμή των γραμμών συστηματικής θεραπείας έως τη στιγμή της επιπλοκής ήταν 2. Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με επιπλοκές ήταν 14.8 μήνες ενώ εκείνων χωρίς ήταν 8.7 μήνες. Συμπεράσματα: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι 62.5% των ασθενών με σύγχρονη εμφάνιση μεταστάσεων από γαστροοισοφαγικό καρκίνο εμφάνισαν στην πορεία της νόσου τους επιπλοκές σχετιζόμενες με την πρωτοπαθή νόσο με διάμεσο χρόνο από την αρχική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τοπικά προχωρημένος ανεγχείρητος ή μεταστατικός γαστρικός καρκίνος έχει κακή πρόγνωση. Η επιβίωση είναι μικρότερη του 1 έτους σε μη ασιατικές χώρες. Η θεραπεία εκλογής είναι η συστηματική θεραπεία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγα δεδομένα για αφαίρεση της πρωτοπαθούς εστίας πριν την έναρξη θεραπείας. Είναι άγνωστο αν η αφαίρεση της πρωτοπαθούς εστίας, αυξάνει την επιβίωση αυτών των ασθενών και μειώνει τη συχνότητα των επιπλοκών που μπορεί να εμφανιστούν από την πρωτοπαθή εστία.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αναδρομική μελέτη ασθενών που διαγνώστηκαν εξαρχής με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό αδenoCa στομάχου, γαστροοισοφαγικής συμβολής ή οισοφάγου που προσήλθαν στην Ογκολογική Κλινική την περίοδο 2019-2024 για έναρξη θεραπείας χωρίς να έχει αφαιρεθεί ο πρωτοπαθής όγκος. Έγινε καταγραφή είδους και συχνότητας επιπλοκών από την πρωτοπαθή εστία, και προσπάθεια συσχετισμού αυτών με χαρακτηριστικά ασθενών και χαρακτηριστικά κακοήθους όγκου. Καταγράφηκε το χρονικό διάστημα της εμφάνισής τους από την αρχική διάγνωση και η διάμεση επιβίωση ασθενών με ή χωρίς επιπλοκές.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση της καταγραφής των επιπλοκών από τον πρωτοπαθή όγκο και πώς αυτές επηρέασαν την επιβίωση των ασθενών.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΦΥΛΟ	
ΑΝΔΡΕΣ	14
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	10
ΕΝΤΟΠΙΣΗ	
ΑΝΤΡΟ	4
ΣΩΜΑ	4
ΠΥΛΩΡΟΣ	2
ΕΛΑΣΣΟΝ ΤΟΣΟ	7
ΜΕΙΖΟΝ ΤΟΞΟ	2
ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΗΠΑΡ	11
ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ	5
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ	2
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ	9



Εικόνα 1: Συμπτώματα πρωτοπαθούς εστίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συμπεριλήφθηκαν 24 ασθενείς (14 άντρες, 10 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 68.25 ετών (εύρος 26 – 82). Οι 23 είχαν μεταστατική νόσο. Οι συχνότερες εστίες δευτεροπαθών εντοπίσεων αφορούσαν το ήπαρ και κοιλιακούς λεμφαδένες. Μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 18 μηνών, δεκαπέντε (62.5%) εμφάνισαν επιπλοκές από τον πρωτοπαθή όγκο εκ των οποίων 7 αιμορραγία, 6 απόφραξη και 2 αιμορραγία και απόφραξη (Εικόνα 1) με διάμεσο χρόνο από την αρχική διάγνωση τους 8 μήνες με εύρος 1-66 μήνες (Εικόνα 2). Η διάμεση τιμή των γραμμών συστηματικής θεραπείας έως τη στιγμή της επιπλοκής ήταν 2. Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με επιπλοκές ήταν 14.8 μήνες (Εικόνα 3) ενώ εκείνων χωρίς ήταν 8.7 μήνες.



Εικόνα 2: Διάμεσος χρόνος εμφάνισης επιπλοκών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παραδοσιακά, το χειρουργείο δεν θεωρείται θεραπευτική επιλογή για το μεταστατικό καρκίνο στομάχου, εκτός από ασθενείς με συμπτώματα όπως αιμορραγία, διάτρηση ή απόφραξη, που μπορεί να χρειαστούν επείγουσες επεμβάσεις. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι 62.5% των ασθενών με σύγχρονη εμφάνιση μεταστάσεων από γαστροοισοφαγικό καρκίνο εμφάνισαν στην πορεία της νόσου τους επιπλοκές σχετιζόμενες με την πρωτοπαθή νόσο με διάμεσο χρόνο από την αρχική διάγνωση τους 8 μήνες. Αντικείμενο προς συζήτηση αποτελεί πως η διάμεση επιβίωση των ασθενών με επιπλοκές είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς επιπλοκές, εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων της μελέτης μας.



Εικόνα 3: Διάμεση επιβίωση