

**ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

Νομικός Α.¹, Τουργέλη Α.², Μουστάκης Η.², Καρατζιάς Γ.², Χρανιώτη Σ.¹

¹Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

²Ω.Ρ.Λ Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εισαγωγή: Το πολύμορφο αδένωμα της παρωτίδος ενίοτε συνυπάρχει με άλλα νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων, καλοήγη ή κακοήγη, στον ίδιο ή σε έτερο σιελογόνο αδένα.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης συνύπαρξης πολυμόρφου αδενώματος παρωτίδος και κυσταδενολεμφώματος (όγκου Warthin).

Υλικό-Μέθοδος: Στο Εργαστήριό μας απεστάλη εγχειρητικό παρασκεύασμα δεξιά παρωτιδεκτομής από άνδρα ασθενή ηλικίας 45 ετών. Κατά τις διατομές αυτού αναγνωρίστηκαν δύο λευκοφαίου χροιάς νεοπλασματικοί όγκοι μ.δ 1,7 και 0,6εκ. αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος εξ' αυτών περιβάλλεται από κάψα, αποτελείται δε από επιθηλιακά και μυοεπιθηλιακά κύτταρα, εντός μυξοχονδροειδούς υποστρώματος. Δεν παρατηρείται ουσιώδης μιτωτική δραστηριότητα. Ο μικρότερος αποτελείται από δύο στοίχους επιθηλιακών κυττάρων (ογκοκύτταρα και βασικά κύτταρα), με παρουσία εντός του στρώματος άφθονου λεμφικού ιστού, με αναγνώριση βλαστικών κέντρων.

Αποτελέσματα: Με βάση τα ανωτέρω μορφολογικά ευρήματα ετέθη η διάγνωση πολυμόρφου αδενώματος παρωτίδος με συνύπαρξη κυσταδενολεμφώματος (όγκου Warthin).

Συμπεράσματα: Η συνύπαρξη δύο νεοπλασμάτων με διαφορετικό ιστολογικό τύπο στον ίδιο σιελογόνο αδένα έχει τόσο διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό ενδιαφέρον και πρέπει να είναι πάντοτε υπόψη των Παθολογοανατόμων προκειμένου να οδηγηθούν στην σωστή ιστολογική διάγνωση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ιστοχημικές και ανοσοιστοχημικές χρώσεις έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί εν συνεχεία η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.