



ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Χαντζάρα Ε, Αϊδαρίνης Χ., Κόκκαλης Α., Λαζάρου Α., Βερβαινιώτης Δ., Κοΐνης Φ., Σαμαράς Ι., Σαλούστρος Ε., Παπαδόπουλος Β., Τσαπακίδης Κ., Κωτσάκης Α.

Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόκειται για περίπτωση ασθενούς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και μεμονωμένη υποτροπή 10 έτη από την αρχική διάγνωση στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου. Αντιμετώπιση με συστηματική θεραπεία και εξαιρετική ανταπόκριση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαντζάρα Ευαγγελία
Ογκολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας
Email: valiaxantzara@gmail.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το 3 % όλων των κακοηθειών. Οι πιο συχνές θέσεις μετάστασης είναι ο πνεύμονας, τα οστά, το ήπαρ και ο εγκέφαλος, ενώ μετάσταση στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου εμφανίζεται σε ένα ποσοστό <1% των ασθενών. Αν και δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες λόγω της σπανιότητας των εν λόγω περιστατικών, η αντιμετώπιση που έχει περιγραφεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις με μεμονωμένη μετάσταση στην περιοχή του τραχήλου είναι η χειρουργική αφαίρεση.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Παρουσίαση περιστατικού με χειρουργηθέν νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και σπάνια υποτροπή στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πρόκειται για ασθενή 75 ετών με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, διαγνωσθέν το 12/2010. Το 12/2010 ο ασθενής υπεβλήθη σε νεφρεκτομή αριστερά και ακιλούθως τέθηκε σε τακτική παρακολούθηση. Μετά από 10 έτη διαπιστώθηκε εκσεσημασμένη τραχηλική διόγκωση δεξιά. Αν και στην αρχική διαφορική διάγνωση τέθηκε το δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα, από τη βιοψία διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μετάσταση από διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα. Από τον έλεγχο σταδιοποίησης ανεδείχθη μια εξεργασία διαμέτρου 9,5x7,5 εκ. με επίκεντρο το δεξιό τμήμα της υπογνάθιας χώρας και σύστοιχοι διογκωμένοι λεμφαδένες, χωρίς άλλες δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Καθώς ο όγκος κρίθηκε ανεγχείρητος, έγινε έναρξη συστηματικής θεραπείας με anelumab/axitinib με συνεχιζόμενη κλινική και απεικονιστική ανταπόκριση. Μετά από 4 χρόνια με την ανωτέρω θεραπεία ο ασθενής παρουσιάζει σταθερότητα νόσου.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς αποτελεί μια σπάνια περίπτωση ασθενούς με υποτροπή νεφροκυτταρικού καρκινώματος με μεμονωμένη μετάσταση στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με συστηματική θεραπεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Pritchik KM, Schiff BA, Newkirk KA (2002) Metastatic renal cell carcinoma to the head and neck. Laryngoscope 112: 1598-601.
2. Pompeo AC, Kanashiro H, Silva MN (2005) Renal cell carcinoma presenting as a cervical mass. Int Braz J Urol 31:151-152
3. Ather MH, Masood N, Siddiqui T (2010) Current management of advanced and metastatic renal cell carcinoma. Urol J 7: 1-9.