

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΗΡΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β Τζούδα , Δ Τιμπλαλέξη , Φ Τζούδας , Γ Ζαφείρη, Μ Μπριστογιάννη, Ι Αλάφης , Ε Σαμαντάς, Ι Σγουρός.

ΓΟΝΚ 'ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ'-Γ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 50% ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού θα εμφανίσουν ηπατικές μεταστάσεις. Έχει δειχθεί ότι ασθενείς με μονήρη ηπατική μετάσταση έχουν καλύτερη πρόγνωση, αλλά περισσότερα δεδομένα απαιτούνται.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Η μελέτη βασίστηκε σε ασθενείς της Κλινικής, με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού τα τελευταία 8 έτη (2013-2021) και σύγχρονη μονήρη ηπατική μετάσταση. Καταγράφηκαν δημογραφικά, ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, η εντόπιση, η τοπική σταδιοποίηση του πρωτοπαθούς όγκου, το μέγεθος της ηπατικής, η θεραπεία.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε όσους υποτροπίασαν μετά την αρχική αντιμετώπιση της νόσου και σε όσους δεν υποτροπίασαν και αναζητήθηκε πόσο οι παραπάνω παράγοντες επηρέασαν την υποτροπή.

ΣΚΟΠΟΣ

Αναζήτηση προγνωστικών παραγόντων και έκβαση ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού και μονήρη ηπατική μετάσταση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συμπεριελήφθησαν 13 ασθενείς (9 άνδρες, 4 γυναίκες) διάμεσης ηλικίας 65 ετών. Σε 2 ο όγκος ήταν στο ορθό, στους υπόλοιπους στο παχύ. Σε 9 ο όγκος ήταν grade II. Όλοι εμφάνισαν σύγχρονη μονήρη ηπατική μετάσταση. Οκτώ ασθενείς υπεβλήθησαν σε ταυτόχρονη εκτομή πρωτοπαθούς όγκου και ηπατικής μετάστασης ακολουθούμενη από 8 κύκλους θεραπείας με Οξαλιπλατίνη και Καπεσιταμίνη (CapOx). Οι υπόλοιποι αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 39 μηνών, 4 ασθενείς (2 άνδρες, 2 γυναίκες) διάμεσης ηλικίας 65 ετών υποτροπίασαν με διάμεσο χρόνο ελεύθερο υποτροπής 9,7 μήνες. Η μέση διάμετρος της ηπατικής ήταν 34 χιλ. Σχετικά με την ηπατική μετάσταση, σε 2 ασθενείς η βλάβη αφαιρέθηκε μετάγχρονα, σε 1 καμία παρέμβαση, ένας υπεβλήθη σε ηλεκτροκαυτηρίαση. Εννέα ασθενείς (2 γυναίκες, 7 άνδρες) διάμεσης ηλικίας 63 ετών δεν υποτροπίασαν. Η μέση διάμετρος της μετάστασης ήταν 35 χιλ. Σε όλους η μετάσταση αφαιρέθηκε είτε σύγχρονα με την πρωτοπαθή (8 περιστατικά), είτε μετάγχρονα (αφού μεσολάβησε χημειοθεραπεία). Όλοι οι ασθενείς της ομάδας, έλαβαν 8 κύκλους CapOx. Δεν βρέθηκε κάποιος από τους παράγοντες που εξετάστηκαν να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ασθενών

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|-----------------------------------------|--------------|
| Σύνολο ασθενών | 13 |
| Ηλικία σε έτη | |
| Διάμεση τιμή | 65 |
| Εύρος | 47-84 |
| Φύλο | |
| Άρρεν | 9 |
| Θήλυ | 4 |
| Μέγεθος ηπατικής μετάστασης σε χιλιοστά | |
| Διάμεση τιμή | 34,5 |
| | |
| Βαθμός διαφοροποίησης 2 (gr II) | 9 |
| | |
| Βαθμός διαφοροποίησης 3 (grIII) | 4 |

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μονήρης ηπατική μετάσταση ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού απαντάται συχνότερα συγχρόνως με την πρωτοπαθή. Στο μικρό αυτό δείγμα, καλύτερη έκβαση παρατηρείται με χειρουργική εκτομή όλης της νόσου και λήψη 6 μηνών CapOx.

Πίνακας 2 : Σύγκριση χαρακτηριστικών μεταξύ της ομάδας των ασθενών που δεν υποτροπίασε η νόσος τους και αυτής με τους ασθενείς που εμφάνισαν υποτροπή

| | Ομάδα ασθενών χωρίς υποτροπή | Ομάδα ασθενών με υποτροπή |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Σύνολο ασθενών | 9 | 4 |
| Μέση διάμετρος ηπατικής μετάστασης (χιλιοστά) | 35 | 34 |
| Πρωτοπαθής εστία | | |
| Παχύ έντερο | 8 | 3 |
| Ορθό | 1 | 1 |
| Πώς αντιμετωπίστηκαν | | |
| Με χειρουργείο πρωτοπαθούς όγκου και μετάστασης και μετά CapOx | 7 | 0 |
| Αφαίρεση πρωτοπαθούς όγκου, ΧΜΘ, μετά αφαίρεση μετάστασης | 1 | 2 |

Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.