

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ



Στέρπης Σωτήριος¹, Φανίδου Δόμνα¹, Ζερβάκης Χαρίλαος¹, Πανταζοπούλου Ακριβή², Σαμπαζιώτης Δημήτριος², Κότσκα Νικολέτα³, Ραζή Ευαγγελία⁴, Σταυρίδη Φλώρα⁵, Στριμπάκος Αλέξιος⁶, Σύριος Ιωάννης⁷, Νικολαΐδη Αδαμαντία⁸, Αθανασιάδης Ηλίας⁸, Στάμου Κωνσταντίνος¹

1. Β' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ 2. Histo Bio Diagnosis, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 3. Νοσηλευτική Υπηρεσία, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ 4. Γ' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 5. Δ' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 6. Ε' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 7. Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ 8. Α' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Εισαγωγή: Η διαχείριση ογκολογικών ασθενών από μια χειρουργική ομάδα, απαιτεί τον περιοδικό έλεγχο των αποτελεσμάτων επιβίωσης.
Σκοπός: Η καταγραφή της σχετιζόμενης με τη νόσο επιβίωσης, της εμφάνισης υποτροπής και της συνολικής επιβίωσης ασθενών με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου.
Μέθοδοι: Μελέτη επιβίωσης των ασθενών με διάγνωση «αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου» που έχουν υποβληθεί σε δυνητικά θεραπευτική κολεκτομή.

Αποτελέσματα:
n=183 ασθενείς (100 άρρενες)
Ηλικία: 69 έτη (30-91)
ASA: 1(57), 2(66), 3(46), 4(14)
Έκφραση CEA: 32/183 (17,4%), I: 1(2,1%), II: 6(10,1%), III: 10(21,2%), IV: 15(55,5%)
Εντόπιση: Δεξιά: 77 (42%), Εγκάρσιο: 12 (6,5%), Αριστερά: 94 (51,3%)
Επεμβάσεις (%Lap): Δεξιά κολεκτομή: 67 (59,7), Εκτεταμένη δεξιά κολεκτομή: 14 (28,5), Εγκαρσιεκτομή: 3 (33,3), Αριστερά κολεκτομή: 80 (51,2), Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή: 9 (11), Υφολική κολεκτομή: 7 (28,5)
Νοσηρότητα: 32/183 (17,4%), Grade I/II: 26 (14,2%), Grade III/IV: 6 (3,2%)
Επανεπέμβαση: 4/183 (2,1%), **Θνητότητα:** 0/183 (0%)
Σταδιοποίηση: I: 46 (25,1%), II: 59 (32,2%), III: 47 (25,6%), IV: 27 (14,7%)
Λεμφαδενική συγκομιδή: Δεξιά κολεκτομή: 34,67 , Εκτεταμένη δεξιά κολεκτομή: 47,8 , Αριστερά κολεκτομή: 27,5
Περινευριδιακή διήθηση (Pni): 38 (περιγράφεται σε 167)
Λεμφαγγειακή διήθηση (Lvi): 51 (περιγράφεται σε 168)
Αγγειακή διήθηση (Vi): 41 (περιγράφεται σε 169)
Tumor Budding: περιγράφεται σε 85 και είναι επιπέδου I: 44, II: 23, III: 18
EMVI: περιγράφεται σε 129 ασθενείς και ανά στάδιο είναι: I: 1/35, II: 4/37, III: 8/36, IV: 14/21
Έλεγχος dMMR: 112/183 (61,2%), dMMR: 16/112 (14,2%)
Εναποθέσεις σε λίπος: 34 (18,5%) **Περιτοναϊκές εμφυτεύσεις:** 15 (8,1%)
Χημειοθεραπεία: Προεγχειρητική: 17 (9,2%), Επικουρική: 81 (44,2%)

