

Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με έκτοπο θυμικό καρκίνωμα ρινοφάρυγγα σε νεαρό άνδρα

Βερίγος Ε.¹, Μάγγου Ε.², Αρδαβάνης Γ.², Μηλιάδου Α.¹, Αρδαβάνης Α.², Χολής Ν.², Περδικάρη Κ.², Σιδηροπούλου Α.¹, Σερέτης Α.¹, Ζαμπάτης Χ.¹, Κουκουράκης Γ.¹

1.Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2. Α' Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι όγκοι του θύμου αδένα είναι πολύ σπάνιες κακοήθειες και το θυμικό καρκίνωμα αποτελεί το 5% εξ' αυτών. Εξωθωρακικές μεταστάσεις παρουσιάζονται στο 1.5-15.5% των περιστατικών. Τα έκτοπα θυμικά καρκινώματα είναι εξαιρετικά σπάνια με κακή πρόγνωση.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση μίας σπάνιας περίπτωσης άρρενος ασθενούς με έκτοπο θυμικό καρκίνωμα του αποκλίματος με πνευμονικές μεταστάσεις κατά την διάγνωση.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής 57 ετών παρουσιάστηκε τον 8/2020 με συμπτωματολογία κεφαλαλγίας, πάρεσης δεξιού απαγωγού νεύρου και συμπτώματα μυασθένειας. Σε MRI βρέθηκε ευμεγέθους χωροκατακτητική εξεργασία 4,9x4,5x4,1 cm στην περιοχή του ρινοφάρυγγα με διήθηση σφηνοειδούς κόλπου, αποκλίματος, ρινικών κόγχων, σε επαφή με τις έσω καρωτίδες και επέκταση στην σκληρά υπερώα και την προγεφυρική δεξαμενή. Υπεβλήθη σε βιοψία της εξεργασίας και η ιστολογική ανέδειξε χαμηλής διαφοροποίησης κακοήθους νεόπλασμα από έκτοπα υπολείμματα θύμου αδένα, Ki67:35-40%. Η σταδιοποίηση ανέδειξε δευτεροπαθείς εντοπίσεις στον πνεύμονα ενώ δεν ανεδείχθη θύμος αδένας. Ο ασθενής υπεβλήθη σε συστηματική χημειοθεραπεία από τον 11/2020 έως τον 01/2021 και ακολούθως σε τοπική ακτινοθεραπεία κεφαλής-τραχήλου λόγω έντονων συμπτωμάτων στην περιοχή της πρωτοπαθούς εστίας με συνέχιση της χημειοθεραπείας μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας. Εν συνεχεία λόγω προόδου νόσου στο ήπαρ έλαβε 2ης γραμμής χημειοθεραπείας. Παρουσίασε νέα επιδείνωση και τέθηκε σε αγωγή με αναστολείς τυροσινικής κινάσης για περίπου 2 χρόνια όπου ο ασθενής κατέληξε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Παρά τα διάφορα θεραπευτικά σχήματα ο ασθενής κατέληξε επιβεβαιώνοντας τα βιβλιογραφικά ευρήματα της άσχημης πρόγνωσης αυτών των ασθενών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Benitez JC, Boucher MÈ, Dansin E, et al. Central Nervous System Metastases in Thymic Epithelial Tumors: A Brief Report of Real-World Insight From RYTHMIC. Journal of Thoracic Oncology: Official Publication of the International Association for the Study of Lung Cancer. 2021;16(12):2144-2149. doi:https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.08.008
- Gharwan H, Chul Sung Kim, Thomas A, et al. Thymic epithelial tumors and metastasis to the brain: a case series and systematic review. 2017;6(5):588-599. doi:https://doi.org/10.21037/tlcr.2017.08.06
- Μπαλταγιάννης Ν, Λαγουδέλλης Α, Ντούβλης Χ, Παυλάκου Α. Όγκοι του θύμου αδένα: συστήματα σταδιοποίησης. | Scientific Chronicles / Epistimonika Chronika | EBSCOhost. openurl.ebsco.com. Published April 1, 2020. Accessed April 19, 2024. https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A6%3A3503270/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A148910691&crl=c

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα έκτοπα θυμικά καρκινώματα είναι σπάνια με πιθανή εντόπιση στην κέφαλο-προσωπική χώρα. Η εμφάνιση πολλαπλών μεταστάσεων κατά την διάγνωση είναι ο κανόνας και η πρόγνωση είναι δυσμενής. Η μέση επιβίωση αυτών των ασθενών δεν ξεπερνάει τα δύο έτη, όπως και στην δική μας περίπτωση.



Σχεδιασμός πλάνου
Ακτινοθεραπείας

CONTACT

Εμμανουήλ Κ. Βερίγος MD, MSc
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Email: manolisverigos@gmail.com
Phone: +30 6986367177