

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

Κοντάνα Ε.¹, Ανδρεάδου Α.¹, Λάλλα Ε.¹, Μπούτης Α.¹, Δουγανιώτης Γ.¹, Φωταρέλλη Α.¹
¹Γ΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Εισαγωγή:

Η εισαγωγή του pembrolizumab στην περιεγχειρητική θεραπεία ασθενών με τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (TNBC) πρώιμου σταδίου άλλαξε την πρόγνωση επιτυγχάνοντας σημαντικό ποσοστό παθολογοανατομικής πλήρους ανταπόκρισης (pathCR).

Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με ανοσοθεραπεία (irAEs) μπορεί να εμφανιστούν επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα οργάνων. Η συχνότητα ποικίλλει ανάλογα με τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται, τον χρόνο έκθεσης αλλά και εγγενείς παράγοντες κινδύνου του ασθενούς.

Μέθοδοι:

Ασθενείς με πρώιμου σταδίου TNBC παραπέμφθηκαν για θεραπεία στην κλινική μας. Καταγράφηκαν ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, ιατρικό ιστορικό, ιστολογικά ευρήματα, καθώς επίσης και παράμετροι σχετιζόμενοι με την θεραπεία.

Αποτελέσματα :

Η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε 36 γυναίκες μέσης ηλικίας 56 ετών (25-85) με διάγνωση TNBC πρώιμου σταδίου. Τα αποτελέσματα της καταγραφής συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες (1,2,3)

ΠΙΝΑΚΑΣ1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TNBC ΜΕ PEMBROLIZUMAB

Κατηγορία	Ποσοστό	Αριθμός (N)
Συμμετέχοντες	100%	36
Διηθητικό καρκίνωμα των πόρων του μαστού	86%	31
Ανάπτυξη τουλάχιστον ενός irAE	56%	20
Εμφάνιση ενδοκриноπάθειας/διαταραχής θυρεοειδούς	42%	15
Απόκτηση μόνιμης βλάβης από irAE	80%	16
Αναβολή θεραπείας λόγω irAE	28%	10
Αναβολή ανοσοθεραπείας λόγω irAE	53%	19
Οριστική διακοπή του pembrolizumab λόγω irAE	22%	8
Νοσηλεία χωρίς προγραμματισμό	28%	10
Ασθενείς με μη χειρουργήσιμη νόσο	8%	3
Ασθενείς που απεβίωσαν πριν την ολοκλήρωση της θεραπείας	3%	1
Pathological Complete Response (pathCR)	41%	15

ΠΙΝΑΚΑΣ2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ PEMBROLIZUMAB

Κατηγορία	%	N
Απορρύθμιση θυρεοειδικής λειτουργίας	73%	11
Νέο συμβάν διαταραχής θυρεοειδούς	27%	4

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΠΑΝΙΑ irAEs

- Τρανσαμινασαιμία
- Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα
- Άνοση θρομβοπενία
- Πνευμονίτιδα
- Έξαρση ρευματοειδούς αρθρίτιδας
- Ινομυαλγία
- Πολυνευροπάθεια

Συμπεράσματα:

Απαιτούνται εκτενέστερες μελέτες για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων ανοσοθεραπείας προκειμένου να επιτευχθεί, εκτός από το εντυπωσιακό κλινικό όφελος, η αποφυγή σοβαρής τοξικότητας.