

# Απόφραξη λεπτού εντέρου σε έδαφος μονήρους μετάστασης από μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Ζαβαλλής Μάριος<sup>1</sup>, Δουληγέρης Χαράλαμπος-Χρήστος<sup>2</sup>, Θεοχαρόπουλος Χαράλαμπος<sup>3</sup>, Καλός Δημήτριος<sup>1</sup>, Μπατής Αντώνιος<sup>1</sup>, Ντάτσης Κωνσταντίνος<sup>1</sup>, Μασσαράς Δημήτριος<sup>1</sup>, Κυριαζή Μαρία<sup>1</sup>

## Εισαγωγή

- Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου από κακοήθεια παγκοσμίως.
- Με συχνότερες δευτεροπαθείς εντοπίσεις στον εγκέφαλο, το ήπαρ, τα επινεφρίδια και τα οστά. Αντιθέτως οι ενδοαυλικές μεταστάσεις στο λεπτό έντερο είναι εξαιρετικά σπάνιες και αναφέρονται μόνο σποραδικά στη βιβλιογραφία.
- Παρουσιάζονται συνήθως με μη ειδική συμπτωματολογία, προσομοιάζοντας άλλες παθήσεις του γαστρεντερικού & καθυστερώντας την διάγνωση.


## Υλικό & Μέθοδος

- Η παρουσίαση ασθενούς με εικόνα ειλεού λεπτού εντέρου, συνέπεια μεμονωμένης μετάστασης από μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, και αντιμετώπισης της στην Χειρουργική Κλινική του Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά».


## Αποτελέσματα



**Εικόνα 1.**  
Διεγχειρητικά: εμφύτευση όγκου στην ειλεοκυφλική βαλβίδα, που προκαλεί απόφραξη του λεπτού εντέρου



**Εικόνα 2.**  
I H&E X100 Microscopic examination of the excised tumour revealed a well demarcated focus of intramural small cell carcinoma with ulceration of the terminal ileum mucosa and multiple peripheral neoplastic lymphovascular emboli



### Ιστορικό ασθενούς

- Ο ασθενής με νεοδιαγνωσθέν μικροκυτταρικό καρκίνο αριστερού πνεύμονα, με μονήρη μεταστατική βλάβη στον εγκέφαλο.
  - Έλαβε 1<sup>ο</sup> κύκλο ΧΜΘ

### Ιστορικό επέμβασης

- Έγινε επείγουσα διερευνητική λαπαροτομία, η οποία αποκάλυψε εμφύτευση ενός μόνο όγκου στην ειλεοκυφλική βαλβίδα, με αποτέλεσμα την εντερική απόφραξη.
- Το προσβεβλημένο τμήμα του τελικού ειλεού αφαιρέθηκε και δημιουργήθηκε πλευρική εντεροεντερική αναστόμωση.

### Ιστοπαθολογική Εξέταση

Επιβεβαιωμένο μεταστατικό SCLC, που ταιριάζει με τον γνωστό πρωτοπαθή όγκο.

## Συμπεράσματα

- Οι μεταστάσεις από μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στο γαστρεντερικό σύστημα είναι εξαιρετικά σπάνιες.
- Ωστόσο, ενδέχεται να υποδιαγινώσκονται, καθώς περιγράφονται πιο συχνά σε ευρείες νεκροτομικές μελέτες συγκριτικά με την αναφερόμενη κλινική τους συχνότητα.
- Η άμεση χειρουργική παρέμβαση συνιστάται τόσο για την αντιμετώπιση της οξείας εικόνας του αποφρακτικού ειλεού όσο και για τη δυνητική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, εφόσον η γενική υγεία του ασθενούς και η σταθερότητα της νόσου το επιτρέπουν.