



# ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ ΜΗ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΠΕΡΙΠΥΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Άννα-Βασιλική Καραμάνη-Πλουμπίδου, Ιωάννης Κοτρογιάννης, Βασίλειος Μεντώνης, Ελευθέριος Φωτίου  
Α΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α ΚΑΤ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής,  
Γ.Ν.Α ΚΑΤ  
Email: [agendocs@kat-hosp.gr](mailto:agendocs@kat-hosp.gr)  
Τηλ.: 2132086380

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Jones MW, Santos G, Patel PJ. Acalculous Cholecystitis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [cited 2025 Aug 29]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459182/>
2. Acalculous Cholecystitis: Background, Etiology, Pathophysiology [Internet]. [cited 2025 Aug 29]. Available from: <https://emedicine.medscape.com/article/187645-overview#a2>
3. nhs.uk [Internet]. 2017 [cited 2025 Aug 29]. Acute cholecystitis. Available from: <https://www.nhs.uk/conditions/acute-cholecystitis/>

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Η οξεία **χολοκυστίτιδα μη λιθιασικής** αιτιολογίας αποτελεί το **10%** των περιστατικών οξείας χολοκυστίτιδας
- Υψηλό ποσοστό **νοσηρότητας και θνησιμότητας >30%**
- Οι κύριες **επιπλοκές** της αλιθιασικής χολοκυστίτιδας είναι:
  1. η **γαγγραινώδης** χολοκυστίτιδα
  2. η **διάτρηση** της χοληδόχου κύστης
  3. το **απόστημα παρά των χοληφόρων**

## ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού, από την εμπειρία της κλινικής μας, με επιπλεγμένη αλιθιασική χολοκυστίτιδα

- Ασθενής – θήλυ 59 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προσήλθε με **άλγος στο ΔΕ υποχόνδριο**
- **Αρχική εκτίμηση:** έντονη ευαισθησία στο ΔΕ υποχόνδριο, οριακά αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια και υψηλή CRP
- **U/S έλεγχο:** χολοκυστίτιδα, **χωρίς λιθίαση**, περιχολοκυστική συλλογή πλησίον του ήπατος
- Η ασθενής εξήλθε ίδια βουλήσει
- 12 ώρες μετά εισαγωγή λόγω επιδείνωση συμπτωμάτων



## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- **MRCP:** χολοκυστίτιδα χωρίς χολολιθίαση, **περιπυλαίο οίδημα** και μικροσυλλογές στην ηπατική πύλη
- Διενέργεια **επείγουσας** λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής
- **Διεγχειρητικά:** **γαγγραινώδης** χολοκυστίτιδα, **χωρίς διάτρηση**, με **περιπυλαίο απόστημα**
- Σύμφωνα με τα διεγχειρητικά ευρήματα η χολοκυστίτιδα αυτή κατατάχθηκε σε αλιθιασική χολοκυστίτιδα **τύπου 4**

**ΕΙΚΟΝΑ:** Διεγχειρητική απεικόνιση - Αποκάλυψη περιπυλαίου αποστήματος κατά την κινητοποίηση της χοληδόχου κύστης - Γαγγραινώδης χολοκυστίτιδα

- **2η μτχ** ημέρα: εργαστηριακή επιδείνωση
- **4η μτχ** ημέρα: **CT** χωρίς παθολογικά ευρήματα
- **6η μτχ** ημέρα: εξιτήριο
- **14η μτχ** ημέρα: **λοίμωξη** χειρουργικού **τραύματος** στην υπομφάλιο τομή με ανεύρεση **Enterococcus spp.**
- Επανεισαγωγή για χορήγηση κατάλληλης i.v. αντιβιοτικής αγωγής για 7 ημέρες – έπειτα εξιτήριο

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η **διάγνωση της αλιθιασικής** χολοκυστίτιδας αποτελεί μεγάλη **πρόκληση** για τους κλινικούς ιατρούς
- Η νόσος **εμφανίζεται κυρίως** σε **βαρέως πάσχοντες** ασθενείς, **άρρηνες**, στην **έκτη δεκαετία** της ζωής
- Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν πληρούσε κανένα από τα δημογραφικά και αιτιολογικά χαρακτηριστικά κάνοντας τη διάγνωση ακόμα πιο δύσκολη