

# ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αριάδνη Τσιάκα, Ιωάννης Σιάννης, Φωτεινή Στέφου, Αναστασία Ζαραφίδου, Μαρία Πολυχρονάκη, Δημήτριος Γερογιάννης, Μαρκέλλα Καλογερά, Παντελής Καλογεράκος, Νικόλαος Ζαμπίτης, Αθανάσιος Μαρίνης  
Γ' Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΚΛΙΝΙΚΗ




ΤΖΑΝΕΙΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΑ

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και καλώς μελετημένες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο βαθμός δυσκολίας της ωστόσο δεν παύει να διανθίζεται από πληθώρα ανατομικών παραλλαγών που αφορούν είτε τα αγγεία είτε τα χοληφόρα.

## ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση δύο περιστατικών, στα οποία διεγχειρητικά αναγνωρίστηκε η δεξιά ηπατική αρτηρία σε ασυνήθιστη θέση και πώς αυτό επηρέασε το χειρουργικό πλάνο.



## ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής θήλυ 34 ετών προσήλθε για προγραμματισμένη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μετά από πολλαπλά επεισόδια χολοκυστίτιδας σε έδαφος χολολιθίασης, κατά τη διάρκεια κύησης. Ασθενής άρρεν 75 ετών προσήλθε για προγραμματισμένη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μετά από ανεύρεση χολολιθίασης και συνοδού χοληδοχολιθίασης.

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διενεργήθηκε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και στα δύο περιστατικά, τηρώντας τις αρχές διενέργειας ασφαλούς χολοκυστεκτομής. Κατά τη διάρκεια αμφότερων των επεμβάσεων αναγνωρίστηκε αρτηριακός κλάδος πορευόμενος κατά μήκος της χοληδόχου κύστεως προς τον πυθμένα αυτής, ο οποίος παρασκευάστηκε επιμελώς και αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για τη δεξιά ηπατική αρτηρία σε ασυνήθιστη θέση εμπροσθεν.

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανεπίπλεκτη διενέργεια της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης είναι εφικτή, ακόμα και σε περιστατικά στα οποία αναγνωρίζονται επιπρόσθετες δυσκολίες, όπως ανατομικές παραλλαγές, καθιστώντας ακόμα πιο αναγκαία την πιστή εφαρμογή των αρχών διενέργειας ασφαλούς χολοκυστεκτομής.

