


## ABSTRACT

Τα πρωτοπαθή μη Hodgkin λεμφώματα του μαστού (PNHBL) είναι μια σπάνια κλινική οντότητα αφού αποτελούν λιγότερο του 1% όλων των μη-Hodgkin λεμφωμάτων καθώς και το 0,5% των νεοπλασμάτων του μαστού. Καταγράψαμε τα περιστατικά που διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας για μια δεκαετία.  
Υλικό και Μέθοδοι:  
Από την μελέτη του αρχείου της κλινικής μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Δεκεμβρίου 2023, εντοπίσαμε 7 ασθενείς που διαγνώστηκαν με πρωτοπαθές μη Hodgkin λέμφωμα μαστού. Καταγράψαμε την διαγνωστική προσέγγιση αλλά και την αντιμετώπιση για κάθε περιστατικό, καθώς και τα ιστολογικά και ανοσοιστοχημικά χαρακτηριστικά του κάθε νεοπλάσματος.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ


- Τα μη Hodgkin λεμφώματα μαστού αποτελούν λιγότερο του 1% όλων των μη Hodgkin λεμφωμάτων καθώς και το 0,5% των νεοπλασμάτων του μαστού.
- Έγινε καταγραφή των περιστατικών που διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην Χειρουργική Κλινική του ΓΑΝΠ Μεταξά για μία δεκαετία (2014-2023)

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



M.O. 63,7 ετών

- 5 ασθενείς παρατήρησαν ψηλαφητή μάζα στον μαστό
- FNA & FNB ήταν διαγνωστική για δύο ασθενείς και η βιοψία εκτομής για πέντε ασθενείς
- Από τους 7 οι 6 αντιμετωπίστηκαν με χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και 1 με ακτινοβολία



## ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

- 7 ασθενείς διαγνώστηκαν με λέμφωμα μη Hodgkin μαστού την δεκαετία μεταξύ Ιανουαρίου 2014 έως Δεκεμβρίου 2023 στη Χειρουργική Κλινική ΓΑΝΠ Μεταξά.
- Έγινε καταγραφή της διαγνωστικής προσέγγισης και της αντιμετώπισης για κάθε περιστατικό, καθώς και τα ιστολογικά και ανοσοιστοχημικά χαρακτηριστικά κάθε νεοπλάσματος

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Τα πρωτοπαθή μη Hodgkin λεμφώματα του μαστού είναι μία σπάνια κλινική οντότητα με μεγάλη ιστοπαθολογική ετερογένεια.
- Είναι ιδιαίτερα σημαντική η καταγραφή, η μελέτη καθώς και η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών σε εξειδικευμένα ογκολογικά νοσοκομεία.