



ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ

Λοΐζου Αννίτα, Μαχαιράς Νικόλαος, Κυκάλος Στυλιανός, Νικητέας Νικόλαος, Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Δημητρούλης Δημήτριος, Μαντάς Δημήτριος
Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα νεοπλασμάτα του μεσεντερίου είναι σπάνια και αποτελούν μια ετερογενή ομάδα βλαβών. Η θεραπεία αυτών των όγκων αποτελεί πρόκληση λόγω της ιδιαιτερότητας της ανατομικής τους θέσης, η οποία συμπεριλαμβάνει μείζον αγγεία μεσεντερίου και μεγάλο μέρος του γαστρεντερικού σωλήνα.

ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός μας είναι η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ευμεγέθους νεοπλασμάτος μεσεντερίου που αντιμετωπίστηκε με εντερεκτομή και σύγχρονη εκτομή και ανακατασκευή τμήματος της άνω μεσεντερίου φλέβας (ΑΜΦ).

ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής 36 ετών, παρουσιάστηκε στην κλινική μας λόγω μιας νεοδιαγνωσθείσας μεσεντερικής βλάβης διαστάσεων 10x10εκ. Κατά την λαπαροτομία διενεργήθηκε ταυτόχρονη εκτομή του πάσχοντος μεσεντερίου και τμήματος του ειλεού, απολίνωση και διατομή της ΑΜΦ που πορευόταν εντός του όγκου και αναστόμωση της αριστερής ωοθηκικής φλέβας με το κολόβωμα της ΑΜΦ και δημιουργία τελικής ειλεοστομίας. Άμεσα μετεγχειρητικά παρουσίασε ενδοκοιλιακή αιμορραγία και κατά την επείγουσα λαπαροτομία, διενεργήθηκε νέα αγγειακή ανακατασκευή των κολοβωμάτων της ΑΜΦ με φλεβικό μόσχευμα έξω λαγονίου φλέβας από συμβατό πτωματικό δότη. Την 8η μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε εκροή χολοβαφούς περιεχομένου από παροχέτευση και ακολούθως υπεβλήθη σε νέα ερευνητική λαπαροτομία όπου διαπιστώθηκε νέκρωση τυφλού και ως εκ τούτου διενεργήθηκε δεξιά κολεκτομή με νησιδοεγκαρσία αναστόμωση. Η λοιπή της πορεία ήταν ανεπίπλεκτη. Η ασθενής παραμένει σε άριστη κλινική κατάσταση 4 μήνες μετεγχειρητικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η σωστή προεγχειρητική αξιολόγηση για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της μάζας και των παρακείμενων αγγειακών και πεπτικών δομών είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να καθορίσει την ανάγκη για εκτενή εκτομή του εντέρου, με αποτέλεσμα εντερική ανεπάρκεια λόγω συνδρόμου βραχέος εντέρου.



α. Αγγειακή ανακατασκευή ΑΜΦ με φλεβικό μόσχευμα. β, γ. παρασκευάσματα εκτομής