



ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ ΣΑΝ ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

INTRODUCTION

Το χολοκυστοκολικό συρίγγιο είναι σπάνια πάθηση με επίπτωση 0,06% έως 0,14%. Είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος συριγγίου μεταξύ χοληδόχου κύστης και γαστρεντερικού σωλήνα, ενώ η διάγνωση συνήθως γίνεται τυχαία κατά τη διενέργεια χολοκυστεκτομής. Η πρώτη επίσημη καταγραφή του έγινε το 1890 από τον Cournoisier και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές αντιμετώπισης με χολοκυστεκτομή και κατάργηση του συριγγίου.

CASE PRESENTATION

- Άνδρας 36 ετών.
- Υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή στα πλαίσια χολοκυστίτιδας από 5ετίας.
- Πολλαπλές συμφύσεις μετατροπή σε λαπαροτομία
- Διαπίστωση ευρείας επικοινωνίας μεταξύ χοληδόχου κύστης και ηπατικής καμπής κόλου
- Διενέργεια ΔΕ κολεκτομής με en block αφαίρεση χοληδόχου κύστης

DISCUSSION

- Χολοκυστοεντερικό συρίγγιο είναι μια σπάνια επιπλοκή που διαπιστώνεται κατά κύριο λόγο διεγχειρητικά.
- ΔΕΝ υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες
- Συνήθως προτείνεται κατάργηση συριγγίου και συρραφή τμήματος κόλου
- Εξατομικευμένη προσέγγιση
- Κολεκτομή σε ευρείες επικοινωνίες και εφόσον μπορεί να υποστηρίξει το κέντρο

REFERENCES

Petros Bangeas General Surgeon
Assistant Professor of Surgery AUTH
pbangeas@gmail.com

Cholecystocolonic fistula as an uncommon cause of diarrhea: a case-report and review of the literature .Chansong Choj et al. Clin J Gastroenterol 2021 Aug;14(4):1147-1151. doi: 10.1007/s12328-021-01413-7. Epub 2021 Apr 10.
Cholecystocolonic Fistula: Case Report and Literature Review. Tatiana Mudrenko, Christopher Chiu. Perm J. 2021 Sep 29;25. doi: 10.7812/TPP/21.014.