

ΠΥΕΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΑΣΘΕΝΗ

Κολιού Νικολέτα¹, Σπυρόπουλος Σπύρος², Καπετανοπούλου Ασπασία³, Σερέτης Χαράλαμπος¹, Μαρτίδη Χρυσάνθη¹, Σπηλιώτης Ιάσωνας - Νικόλαος¹, Πατρικάκος Παναγιώτης¹

¹ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
² Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
³ Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»


34^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
και International Surgical Forum
με διεθνή συμμετοχή

19-23
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο
Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Εισαγωγή

Αποστήματα εμφανίζονται σε περίπου 10–28% των ασθενών με Crohn κατά την πορεία της νόσου. Στο ~10% των ασθενών με Crohn, που οδηγήθηκε στο χειρουργείο ανευρέθη πυελικό απόστημα, με το 60–70% αυτών να μην έχει εντοπιστεί προεγχειρητικά κατά τον έλεγχο. Η εμφάνιση αποστήματος ως πρώτης εκδήλωσης είναι ιδιαίτερα σπάνια.

Σκοπός

Να παρουσιαστεί σπάνιο περιστατικό πυελικού αποστήματος ως αρχική εκδήλωση νόσου Crohn σε 17χρονη ασθενή και να συζητηθεί η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση, σε συνδυασμό με δεδομένα από τη βιβλιογραφία.

Υλικό και Μέθοδος


Πρόκειται για κοπέλα 17 ετών με εμπύρετο, αυξημένους δείκτες φλεγμονής και εμμένον άλγος κάτω κοιλίας από εξαμήνου με επανειλημμένες επισκέψεις στο ΤΕΠ με άτυπα συμπτώματα, χωρίς διαρροϊκό σύνδρομο και αρνητική κολονοσκόπηση χωρίς έλεγχο τελικού ειλεού. Ο απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα – αξονική) ανέδειξε πυελική συλλογή. Λόγω μη ανταπόκρισης στην αντιβιοτική αγωγή και μη κλινικής βελτίωσης υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροσκόπηση.

Αποτελέσματα

Διεγχειρητικά ανευρέθη πυελικό απόστημα μεταξύ τελικού ειλεού – σιγμοειδούς και ουροδόχου κύστεως και εικόνα έρποντος λίπους γύρω από τον τελικό ειλεό, με φλεγμονώδη απεικόνιση στα τελευταία 20 εκ. χωρίς άλλα σημεία κατά τον έλεγχο του λεπτού εντέρου. Έγινε παροχέτευση του αποστήματος, λήψη βιοψιών και καλλιέργειών, σκωληκοειδεκτομή και εκτομή κυστικού μορφώματος εξ αριστερού εξαρτήματος και στάλθηκε ιστολογική. Η ιστολογική εξέταση ορώδες κυσταδένωμα ωθήκης και σκωληκοειδής απόφυση άνευ ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων. Η ασθενής παραπέμφθηκε για περαιτέρω γαστρεντερολογική αντιμετώπιση



CT: Πάχυνση τελικού ειλεού



CT: Απόστημα πύελου & Κυστικό μόρφωμα αριστερού εξαρτήματος

Συμπεράσματα

Το πυελικό απόστημα μπορεί να αποτελεί αρχική εκδήλωση νόσου Crohn, ειδικά σε εφήβους με μη ειδική συμπτωματολογία.

Η λαπαροσκόπηση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διάγνωση και θεραπεία, παρέχοντας ταυτόχρονα παροχέτευση και ιστολογική επιβεβαίωση.


Η έγκαιρη αναγνώριση και η συνεργασία χειρουργών–γαστρεντερολόγων είναι καθοριστική για την πορεία της νόσου.

Βιβλιογραφία


- Creeping Fat in the Pathogenesis of Crohn's Disease: An Orchestrator or a Silent Bystander? Efthymios P Tsounis, Ioanna Aggeletopoulou, Athanasia Mouzaki, Christos Triantos
- Feagins LA, Holubar SD, Kane SV, Spechler SJ. Current strategies in the management of intra-abdominal abscesses in Crohn's disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(10):842-850.
- Keighley MR, Eastwood D, Ambrose NS, Allan RN, Burdon DW. Incidence and microbiology of abdominal and pelvic abscess in Crohn's disease. Gastroenterology. 1982;83(6):1271-1275.
- Dotsion JL, Bashaw H, Nwomeh B, Crandall WV. Management of intra-abdominal abscesses in children with Crohn's disease: a 12-year, single-center experience. Inflamm Bowel Dis. 2015;21(5):1109-1114.
- Greenstein AJ, Sachar DB, Mann D, Lachman P, Heimann T, Aufses AH Jr. Spontaneous free perforation and intra-abdominal abscess in 30 patients with Crohn's disease. Ann Surg. 1987;205(1):72-76.
- McKee RF, Keenan RA, Munro A. Intra-abdominal abscesses complicating Crohn's disease: results of surgical treatment. Br J Surg. 1990;77(7):739-741.
- Sauer CG, Kugathasan S. Pediatric Crohn's disease: update on presentation, complications, and natural history. Curr Gastroenterol Rep. 2009;11(6):473-480.




Διεγχειρητική εικόνα έρποντος λίπους τελικού ειλεού



Πλαστρον ειλεού - σιγμοειδούς στην πύελου



Σκωληκοειδεκτομή



Παροχέτευση αποστήματος πύελου & εκτομή κυστικού μορφώματος