

Η Χρήση συσκευής VAC για την αντιμετώπιση του τραύματος μετά επεμβάσεις εκτομής κύστης κόκκυγος

Καλύβας Κωνσταντίνος, Σικαλιάς Νικόλαος, Σιαβελή Μαρία, Παυλίδη Σοφία, Μενύχτα Κωνσταντίνα, Νικολακέας Μιχαήλ.
Χειρουργική Κλινική , Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε νεαρούς ενήλικες, με σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως επιμόλυνση και καθυστερημένη επούλωση του τραύματος. Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν ανοιχτή επούλωση, συρραφή ή πλαστικές αποκαταστάσεις, όμως συχνά συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό υποτροπών και παρατεταμένο χρόνο ανάρρωσης. Η χρήση της συσκευής αρνητικής πίεσης VAC (Vacuum Assisted Closure) έχει αναδειχθεί ως αποτελεσματική εναλλακτική για τη διαχείριση δύσκολων, επιμολυσμένων ή χρόνιων τραυμάτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε νεαρούς ενήλικες, με σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως επιμόλυνση και καθυστερημένη επούλωση του τραύματος. Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν ανοιχτή επούλωση, συρραφή ή πλαστικές αποκαταστάσεις, όμως συχνά συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό υποτροπών και παρατεταμένο χρόνο ανάρρωσης. Η χρήση της συσκευής αρνητικής πίεσης VAC (Vacuum Assisted Closure) έχει αναδειχθεί ως αποτελεσματική εναλλακτική για τη διαχείριση δύσκολων, επιμολυσμένων ή χρόνιων τραυμάτων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε νεαρούς ενήλικες, με σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως επιμόλυνση και καθυστερημένη επούλωση του τραύματος. Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν ανοιχτή επούλωση, συρραφή ή πλαστικές αποκαταστάσεις, όμως συχνά συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό υποτροπών και παρατεταμένο χρόνο ανάρρωσης. Η χρήση της συσκευής αρνητικής πίεσης VAC (Vacuum Assisted Closure) έχει αναδειχθεί ως αποτελεσματική εναλλακτική για τη διαχείριση δύσκολων, επιμολυσμένων ή χρόνιων τραυμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε νεαρούς ενήλικες, με σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως επιμόλυνση και καθυστερημένη επούλωση του τραύματος. Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν ανοιχτή επούλωση, συρραφή ή πλαστικές αποκαταστάσεις, όμως συχνά συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό υποτροπών και παρατεταμένο χρόνο ανάρρωσης. Η χρήση της συσκευής αρνητικής πίεσης VAC (Vacuum Assisted Closure) έχει αναδειχθεί ως αποτελεσματική εναλλακτική για τη διαχείριση δύσκολων, επιμολυσμένων ή χρόνιων τραυμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κύστη κόκκυγος αποτελεί συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε νεαρούς ενήλικες, με σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως επιμόλυνση και καθυστερημένη επούλωση του τραύματος. Οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν ανοιχτή επούλωση, συρραφή ή πλαστικές αποκαταστάσεις, όμως συχνά συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό υποτροπών και παρατεταμένο χρόνο ανάρρωσης. Η χρήση της συσκευής αρνητικής πίεσης VAC (Vacuum Assisted Closure) έχει αναδειχθεί ως αποτελεσματική εναλλακτική για τη διαχείριση δύσκολων, επιμολυσμένων ή χρόνιων τραυμάτων.

