

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης τύπου Bochdalek σε ενήλικη ασθενή με οξεία θωρακική συμπτωματολογία – Παρουσίαση περιστατικού

Λαγομιτζής Παναγιώτης, Χρυσής Γεώργιος, Μούτσος Χρήστος, Μυργιώτης Ευάγγελος, Ναστακοπούλου Ευτυχία, Κατσάνεας Αθανάσιος, Πηγή Δανάη, Μπουρουτζής Παναγιώτης, Γιόβας Δημήτριος, Ανδριανέσης Ευστράτιος, Lina Abumustafa, Νίνος Ανέστης, Δουρίδας Γεράσιμος

Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαφραγματοκήλη τύπου Bochdalek είναι σπάνια συγγενής ανωμαλία, που συνήθως διαγιγνώσκεται στη νεογνική ηλικία. Η εμφάνιση της σε ενήλικες είναι εξαιρετικά ασυνήθης και συχνά μιμείται καρδιολογικά ή πνευμονικά νοσήματα.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση σπάνιου περιστατικού ενήλικης ασθενούς με διαφραγματοκήλη τύπου Bochdalek, η οποία προσήλθε με θορυβώδη συμπτωματολογία μιμούμενη καρδιολογικό επείγον.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ



Ασθενής 65 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ με έντονο θωρακικό άλγος και δύσπνοια. Αξονική τομογραφία έδειξε κήλη δια του αριστερού ημιδιαφράγματος με είσοδο του στομάχου στη θωρακική κοιλότητα. Υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση με συρραφή και τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμου πλέγματος και θωρακική παραχέτευση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή, με αποσωλήνωση την επόμενη ημέρα και εξιτήριο την 5η μετεγχειρητική ημέρα χωρίς επιπλοκές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαφραγματοκήλη Bochdalek σε ενήλικες μπορεί να μιμείται καρδιολογικό επείγον και απαιτεί έγκαιρη διάγνωση. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.



Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση κήλης Bochdalek
Αυτή η εικόνα λήφθηκε μετά από ανατομή και πλήρη απελευθέρωση του στομάχου και του οισοφάγου, τα οποία αποσυνδέθηκαν από το διάφραγμα με κοπή του γαστροφρενικού συνδέσμου. Τα βέλη δείχνουν: 1) την κήλη Bochdalek, 2) την παραοισοφαγική κήλη και 3) τον οισοφάγο.

