

# ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΆ ΑΡΝΗΤΙΚΌ ΚΑΙ HER2-ΘΕΤΙΚΌ ΚΑΡΚΙΝΝΟ ΜΑΣΤΟΎ

ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ<sup>1</sup>, ΜΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ<sup>2</sup>, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ<sup>3</sup>, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ<sup>4</sup>, ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ<sup>2</sup>

1 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΛΑΪΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

3. DEPARTMENT OF SURGERY, UNIVERSITY OF COLORADO ANSCHUTZ MEDICAL CAMPUS

4 ΕΘΝΙΚΌ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.

## Εισαγωγή

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας που σχετίζονται με τον καρκίνο παγκοσμίως. Η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία (NAC) αποτελεί καίριο παράγοντα της θεραπευτικής αντιμετώπισης, προσφέροντας οφέλη όπως η μείωση του μεγέθους του όγκου, η διευκόλυνση της διατήρησης του μαστού, συνολική επιβίωση (OS) και επιβίωση και η βελτίωση της επιβίωσης. Η επίτευξη πλήρους παθολογικής ανταπόκρισης (pCR) σχετίζεται σημαντικά με βελτιωμένη χωρίς νόσο (DFS), ιδιαίτερα σε βιολογικά πιο επιθετικούς καρκίνους του μαστού, όπως ο τριπλά αρνητικός (TNBC) και ο HER2-θετικός.

## Υλικά και Μέθοδοι

Μελετήσαμε αναδρομικά όλες τις ασθενείς με χειρουργικά εξαιρεσίμο καρκίνο μαστού, που υποβλήθηκαν σε NAC μεταξύ 1/2019 και 12/2023 στην Χειρουργική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά».

## Αποτελέσματα

114 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Παρατηρήθηκε pCR μετά NAC σε 26 ασθενείς (22,6%), ενώ υπολειπόμενη νόσος ανιχνεύθηκε σε 88 ασθενείς (77,4%). Από τις ασθενείς με pCR, 42% αφορούσαν σε HER2-θετικούς όγκους και 31% σε τριπλά αρνητικούς καρκίνους μαστού.

## Συμπεράσματα

Η σημασία της pCR ως ισχυρού προγνωστικού δείκτη καλύτερης επιβίωσης ειδικά στις ασθενείς με τριπλά αρνητικό ή HER2+ καρκίνο του μαστού επιβεβαιώνεται κλινικά διαρκώς. Καθώς νέες, αποτελεσματικότερες νεοεπικουρικές θεραπείες διερευνώνται, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών θα επιτυγχάνει pCR. Νέες μελέτες μένει να καθορίσουν αν η επίτευξη pCR σε καρκίνο μαστού πρέπει να τροποποιήσει την ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία, χωρίς να υπονομεύεται η μακροχρόνια επιβίωση και ο έλεγχος της νόσου

