

Παρουσίαση περιστατικού πρώιμου ορθικού καρκίνου MSI- High με πλήρη κλινική υποστροφή μετά από ανοσοθεραπεία.



Αικατερίνη Σαράφη ⁽¹⁾, Γεώργιος Παπαζοΐνης ⁽²⁾, Αικατερίνη Λεβέντη ⁽¹⁾, Άρης Πλαστήρας ⁽¹⁾, Γεώργιος Καβαλιεράτος ⁽¹⁾, Ηρακλής Κατσούλης ⁽¹⁾, Δημήτριος Κορκολής ⁽¹⁾, Θεόδωρος Τσίρλης ⁽¹⁾

Χειρουργική Ογκολογική Κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α Άγιος Σάββας ⁽¹⁾
Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α Άγιος Σάββας ⁽²⁾

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόσφατες κλινικές μελέτες, έδειξαν υψηλά ποσοστά πλήρους κλινικής ανταπόκρισης (cCR) μετά από ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο ορθού MSI-H.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση περιστατικού με πρώιμο MSI-H καρκίνο ορθού, όπου εφαρμόστηκε ανοσοθεραπεία σε ασθενή με επιλεγμένο χειρουργικό και ογκολογικό ιστορικό

ΥΛΙΚΑ- ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής 54 ετών, BMI 42 με ιστορικό χειρουργηθέντος και ακτινοβοληθέντος καρκίνου τραχήλου της μήτρας , διαγνώστηκε με αδеноκαρκίνωμα ορθού. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε βλάβη στα 7 εκ σταδίου **T2N0**.

Το ογκολογικό συμβούλιο συνέστησε **χειρουργική αντιμετώπιση**.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χαμηλή πρόσθια εκτομή κατά Hartmann, μερική κυστεκτομή και εντερεκτομή λόγω εκτεταμένων μετακτινικών αλλοιώσεων .Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε φλεγμονώδεις αλλοιώσεις χωρίς την παρουσία νεοπλασματικού όγκου.

Ενδοσκόπηση του κολοβώματος ανέδειξε αδеноκαρκίνωμα ορθού στα 4 εκ. επί της γραμμής συρραφής

Ακολούθησε μοριακός έλεγχος **θετικός για MSI** και αποφασίστηκε η χορήγηση **ανοσοθεραπείας**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά από τρεις μήνες ανοσοθεραπείας, η ασθενής εμφάνισε cCR με πλήρη απεικονιστική, ενδοσκοπική και κλινική υποστροφή της νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η περίπτωση αναδεικνύει τη σημασία της **μοριακής ταυτοποίησης** στον καρκίνο του ορθού ακόμη και σε πρώιμα στάδια.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, οι στρατηγικές **διατήρησης του οργάνου** μπορούν να αποτελέσουν ασφαλής και αποτελεσματικές επιλογές σε επιλεγμένα κέντρα με **έμπειρες ομάδες και αυστηρά πρωτόκολλα παρακολούθησης**.