

## ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΚΥΣΤΗ ΩΟΘΗΚΗΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΑ: ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 16 ΗΜΕΡΩΝ

Γιώργος Χάχαλης, Σταυρούλα Περβανά, Ελισσάβητ Παζαρή, Ελευθερία Μάσσα, Ουρανία Μπατσή, Στέλιος Κατσαρός

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο "Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης"

**Σκοπός:** Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης αμφοτερόπλευρης εμβρυϊκής κύστης της ωοθήκης σε βρέφος 16 ημερών.

**Υλικό και Μέθοδοι:** Στο νοσοκομείο μας σε βρέφος 16 ημερών πραγματοποιήθηκε κλινικοεργαστηριακός έλεγχος. Από την μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε κυστική βλάβη στην δεξιά ωοθήκη διαστάσεων: 4,5x4x4,2 εκ, και στην αριστερή ωοθήκη διαστάσεων: 5x2,5x0,4 εκ. Πραγματοποιήθηκε ερευνητική λαπαροτομία και εκτομή των κυστικών μορφωμάτων των ωοθηκών. Στο εργαστηριό μας παραλάβαμε τοίχωμα δεξιάς ωοθήκης διαστάσεων: 4,5x2,1x0,5 εκ. αριστερής ωοθήκης διαστάσεων: 5x2,5x0,4 εκ. και σκωληκοειδή απόφυση μήκους 2,1 εκ μ.δ 0,6 εκ.

**Αποτελέσματα:** Η ιστολογική εξέταση έδειξε τοίχωμα κύστης το οποίο επαλείφεται από μονόστιβο κυβοειδές επιθήλιο χωρίς στοιχεία κυτταρικής ατυπίας. Παρατηρούνται επίσης αιμορραγικές διαποτίσεις διατεταμένα υπεραϊμικά αγγεία και εστίες μικροεπασβετώσεων. Αναγνωρίζεται ωοθηκικός ιστός με πρωτογενή ωοθυλάκια. **Τα ιστολογικά ευρήματα είναι συμβατά με εμβρυϊκή κύστη ωοθηκών.**

**Συμπεράσματα:** Τονίζεται η σπανιότητα της περίπτωσης της εντόπισης της εμβρυϊκής κύστης της ωοθήκης αμφοτερόπλευρα. Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί ελάχιστες περιπτώσεις. Θεραπεία εκλογής είναι η εκτομή. Παρατηρείται πιο συχνά στην 35 βδομάδα της εγκυμοσύνης.

