

Ενημέρωση, αντιλήψεις και πρόθεση εμβολιασμού για τον RSV σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.

Ρουσογιάννη Ελένη¹, Περλεπέ Γαρυφαλλιά Ειρήνη¹, Γούτα Ευδοξία¹, Μπέη Βασιλική¹, Περήφανου Μαρία¹, Κολοκοτρώνη Βασιλική¹, Παπαγιάννης Δημήτριος², Ρούκα Ερασμία², Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος¹

1. Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 41500 Λάρισα, Ελλάδα


2. Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Εμβολίων, Νοσηλευτική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα, Ελλάδα

INTRODUCTION

Παρά τη σημαντική κλινική του σημασία και την εφαρμογή εμβολιαστικών προγραμμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με RSV λοίμωξη μεταξύ ηλικιωμένων και ασθενών με συνοσηρότητες παραμένουν περιορισμένες.

METHODS AND MATERIALS

- 304 ασθενείς
- Ε.Ι. Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)
- 09/2024 - 12/2024
- Ερωτηματολόγια:
 - Awareness
 - Knowledge
 - Attitudes
 - Perceptions
 - Behaviors



RESULTS

- ✓ Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 60 έτη, εκ των οποίων 154 άνδρες και 150 γυναίκες.
- ✓ Το 50% των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- ✓ Τέσσερις στους πέντε ασθενείς (80%) παρουσίαζαν χρόνια προβλήματα υγείας, κυρίως αναπνευστικές συνοσηρότητες (50%, κυρίως άσθμα) και καρδιαγγειακές παθήσεις (30%).
- ✓ Μόνο δύο συμμετέχοντες γνώριζαν ότι είχαν διαγνωστεί με RSV στο παρελθόν, ενώ μόλις 10 ασθενείς (3%) είχαν εμβολιαστεί.
- ✓ Το 25% είχε ακούσει για τον RSV, ενώ μεγάλο ποσοστό (65–80%) των συμμετεχόντων δήλωσε αβεβαιότητα σχετικά με βασικές, αντικειμενικές γνώσεις για τη λοίμωξη.
- ✓ Ανάλυση προγνωστικών παραγόντων έδειξε ότι υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και ύπαρξη αναπνευστικών συνοσηροτήτων συσχετιζόνταν με καλύτερη ενημέρωση για τον RSV, ενώ οι καρδιαγγειακές παθήσεις συνδέονταν με χαμηλότερη γνώση για τον ιό.
- ✓ Μόλις το 15% των συμμετεχόντων γνώριζε την ύπαρξη διαθέσιμου εμβολίου. Παρά τη χαμηλή ενημέρωση (83% δεν αισθανόταν επαρκώς ενημερωμένοι για τους κινδύνους της RSV λοίμωξης), οκτώ στους δέκα εξέφρασαν πρόθεση να εμβολιαστούν, με το 17% του συνόλου να δηλώνει εξαιρετικά υψηλή προθυμία.
- ✓ Σχεδόν όλοι οι ασθενείς θεωρούσαν σημαντικό να γνωρίζουν την ακριβή αιτία των συμπτωμάτων τους και ανέδειξαν τον θεράποντα γιατρό ως τον πλέον αξιόπιστο φορέα ενημέρωσης για τον RSV.




Figure 1. Predictors of RSV Awareness




Figure 2. Willingness for RSV vaccination

CONCLUSIONS

Οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα φαίνεται να είναι λιγότερο ενημερωμένοι για τον RSV σε σχέση με όσους έχουν πνευμονικές παθήσεις. Παρά αυτό, τέσσερις στους πέντε εκφράζουν πρόθεση να εμβολιαστούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης στον χώρο της υγείας.

REFERENCES

1. Havers, F. P. et al. *Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Characteristics and Outcomes Among Adults Aged ≥ 60 Years Hospitalized with Laboratory-Confirmed Respiratory Syncytial Virus-RSV-NET.* <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/133296>
2. *RSV in older adults. (2024, August 30). Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV).* <https://www.cdc.gov/rsv/older-adults/index.html>