

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΜΑΣΤΟΥ: ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ; Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Μαυροκέφαλος Νικόλαος¹, Μπίζος Αριστείδης¹, Πατσούρας Αλέξανδρος¹, Κουρούνας Νικόλαος¹, Πέρου Αναστασία¹, Πόταρη Χριστίνα¹, Νικολακοπούλου Ασημίνα¹, Τσαρουχά Αιμιλία¹

¹ 2^η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα, Ελλάδα

Γενικό
Νοσοκομείο
Νοσημάτων
Θώρακος
Αθηνών



ABSTRACT

Ασθενής 70 ετών με γνωστό πλακώδες καρκίνωμα δεξιού κάτω λοβού, διερευνήθηκε για νέα βλάβη στο δεξί μαστό. Η ασθενής προσήλθε με δύσπνοια ηρεμίας και ΑΑ υποξαιμικού τύπου, η οποία αποδόθηκε σε λοίμωξη αναπνευστικού στο έδαφος της γνωστής ανοσοκαταστολής. Ο απεικονιστικός έλεγχος με CT θώρακος ανέδειξε υπεζωκοτική συλλογή ΔΕ και πύκνωση στον ΔΑΛ. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε εκτεταμένο οίδημα και ερυθρότητα στο δεξί μαστό, με χαρακτηριστικά "φλοιού πορτοκαλιού" και ψηλαφητό σκληρό μόρφωμα. Υποβλήθηκε σε παρακλινία παρακέντηση υπό υπερήχους από πνευμονολόγο, η οποία τεκμηρίωσε στο μαστό κακοήθεια πλακώδους τύπου, με προέλευση τον πνεύμονα.

Συζήτηση

Η μετάσταση του καρκίνου του πνεύμονα στο μαστό αναφέρεται σπάνια, και τα κλινικά δεδομένα είναι περιορισμένα. Ειδικά, το πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα σπάνια μεθίσταται στο μαστό και η πρόγνωση είναι κακή. Η υπερηχογραφία, όπως αποδείχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι μια πολύτιμη διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση και αξιολόγηση βλαβών, σε ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα ή βαριά κλινική εικόνα, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

Συμπεράσματα

Η κλινική υποψία μεταστάσεων σε ασθενείς με γνωστές κακοήθειες είναι κρίσιμη για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανεύρεση κακοήθειας στον μαστό επιβεβαίωσε την πρόοδο της νόσου και την ανάγκη για περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η υπερηχογραφία αποδείχθηκε χρήσιμη, εξασφαλίζοντας μία γρήγορη και αποτελεσματική διάγνωση, χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση της ασθενούς, δεδομένης της βαριάς κλινικής κατάστασης της.

CONTACT

Μαυροκέφαλος Νικόλαος
2^η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Email: 2pneumo@gmail.com
Phone: 2107763114

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μετάσταση καρκίνου σε εξωπνευμονικά όργανα αποτελεί σημαντική πρόκληση στην ογκολογία, ειδικά όταν η εντόπιση είναι σπάνια και η διάγνωση απαιτεί προσεκτική κλινική και απεικονιστική αξιολόγηση. Τα πλακώδη καρκινώματα του πνεύμονα, ενώ συχνά επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά, σπάνια εξαπλώνονται στο μαστό, καθιστώντας τέτοιες περιπτώσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την κλινική κοινότητα. Παρακάτω παρουσιάζουμε μία τέτοια περίπτωση, καθώς και πώς συνέβαλε ο υπέρηχος θώρακα στη διάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γυναίκα 70 ετών με γνωστό πλακώδες καρκίνωμα δεξιού κάτω λοβού, διερευνήθηκε για νέα βλάβη στο δεξί μαστό. Η ασθενής προσήλθε με δύσπνοια ηρεμίας και ΑΑ υποξαιμικού τύπου, η οποία αποδόθηκε σε λοίμωξη αναπνευστικού στο έδαφος της γνωστής ανοσοκαταστολής. Ο απεικονιστικός έλεγχος με CT θώρακος ανέδειξε υπεζωκοτική συλλογή ΔΕ και πύκνωση στον ΔΑΛ. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε εκτεταμένο οίδημα και ερυθρότητα στο δεξί μαστό, με χαρακτηριστικά "φλοιού πορτοκαλιού" και ψηλαφητό σκληρό μόρφωμα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δεδομένης της βαριάς κλινικής κατάστασης της ασθενούς και της ανάγκης για έγκαιρη ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης του μαστού, αποφασίστηκε η παρακλινία παρακέντηση της βλάβης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Πραγματοποιήθηκε παρακλινία FNA μαστού υπό υπέρηχο, απ' όπου η ιστολογική εξέταση ανέδειξε μεταστατική βλάβη από το γνωστό πλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η μετάσταση του καρκίνου του πνεύμονα στο μαστό αναφέρεται σπάνια, και τα κλινικά δεδομένα είναι περιορισμένα. Ειδικά, το πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα σπάνια μεθίσταται στο μαστό και η πρόγνωση είναι δυσμενής. Η υπερηχογραφία, όπως αποδείχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι μια πολύτιμη διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση και αξιολόγηση βλαβών, σε ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα ή βαριά κλινική εικόνα, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κλινική υποψία μεταστάσεων σε ασθενείς με γνωστές κακοήθειες είναι κρίσιμη για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανεύρεση κακοήθειας στον μαστό επιβεβαίωσε την πρόοδο της νόσου και την ανάγκη για περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η υπερηχογραφία αποδείχθηκε χρήσιμη, εξασφαλίζοντας μία γρήγορη και αποτελεσματική διάγνωση, χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση της ασθενούς, δεδομένης της βαριάς κλινικής κατάστασής της.

ΠΗΓΕΣ

1. Wang L, Wang SL, Shen HH, Niu FT, Niu Y. Breast metastasis from lung cancer: a report of two cases and literature review. *Cancer Biol Med.* 2014 Sep;11(3):208-15. doi: 10.7497/j.issn.2095-3941.2014.03.007. PMID: 25364582; PMCID: PMC4197421
2. Mirrieles JA, Kapur JH, Szalkucki LM, Harter JM, Salkowski LR, Strigel RM, Traynor AM, Wilke LG. Metastasis of primary lung carcinoma to the breast: a systematic review of the literature. *Journal of Surgical Research.* 2014 May 15;188(2):419-31.

